






Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависи-мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹					
																RU	BY	UA	KZ		
Эфедрин <i>Бронхолитин, Бронхотон</i>	Стимулятор	Фенэтиламин 	Утилитарное, торчевое	Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Алкалоид эфедры. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глауцин, перекрывающий часть побочек и тоже обладающий психоактивными свойствами. Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт, ну или вас тошнит от поглощения неприятных на вкус жидкостей. Сильно сужает сосуды. Внимание: стимуляторы могут вызывать тахикардию, гипертензию, вазоконстрикцию. Сердечникам пить с осторожностью. Для купирования побочек есть магний и ниацин.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессонница, тахикардия, гипертензия, температура, вазоконстрикция	Амфетамины, x-NBOMe, DO-х, ипомея, ИМАО	4	2	55	115	4	9	Слабая	КЩЭ	Трудно	?	Без рецепта	?	
Псевдоэфедрин <i>Каффетин Колд</i>	Стимулятор	Фенэтиламин 	Утилитарное, торчевое	Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и меньше эйфории. Сильно разгоняет сердце, как и эфедрин. Покупается в виде таблеток с DXM (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола, так как парацетомол чрезвычайно токсичен, и попытка жрать неотбитым обернется отказом печени. Способа разделить DXM и псевду пока не нашли.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория	Бессонница, тахикардия, гипертензия, температура, вазоконстрикция	Амфетамины, x-NBOMe, DO-х, ипомея, ИМАО	4	2	100	200	4	9	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?	?	?
Сибутрамин <i>Голдлайн, Редуксин</i>	Стимулятор	Фенэтиламин 	Утилитарное, торчевое	Средство для похудения, отбивает аппетит. Тоже нечто амфетаминоподобное. Дает неприятную стимуляцию, тряску, мазию, и прочие эффекты похожие на СИОЗС антидепрессанты. Возможно использование для СДВГ. Дорогое. За заказ средств кроме официально зарегистрированных в РФ будет бутылка.	ИОЗ серотонина ¹² , норадреналина и дофамина	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, аритмия, гипертензия, головная боль, тошнота, задержка мочи	Мускат, СИОЗС, трамадол, талентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-НТР	3	3	15	60	6	10	Слабая		Трудно	?	?	?	
Атомоксетин <i>Страттера, Когнитерра</i>	Стимулятор	? 	Утилитарное, торчевое	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и мажет, без эйфории. Стоит дорого, но у индусов можно заказать значительно подешевле. Есть мнение, что самая пиздатая именно страттера, а индусские варианты говно, но ее сейчас уже хуй найдешь в аптеках.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота, задержка мочи		3	3	25	120	4	6	Нет или неизвестно		Средне	?	Нет в аптеках	Средне	
Модафинил	Стимулятор	Бензгидрил 	Утилитарное, торчевое	Изначально лекарство от нарколепсии, подходит так же как более пиздатая замена атомоксетину. В России больше недоступен, и за попытку заказа у индусов скорее всего будет сгуха. В Украине и Казахстане покупается в магазинах для качков.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		3	4	100	400	5	10	Нет или неизвестно		Список I/II	?	Нет в аптеках	Нет в аптеках	

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависи- мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹			
																RU	BY	UA	KZ
Бупропион	Стимулятор	 Фенэтиламин	Утилитарное, торчевое	Еще один ныне запрещенный в РФ психостимулятор, считается прекурсором катинонов, были случаи набутылывания за попытку провезти. В других странах продается как антидепрессант, но так же подходит для СДВГ и бросания курить. В очень больших дозах вызывает делирий.	ИОЗ дофамина и норадреналина, Н-холинолитик	Стимуляция, эйфория	Тахикардия, тошнота		3 4	150	300	8	12	Слабая		Список I/II ?	Трудно	Нет в аптеках	
Кофеин	Стимулятор	 Ксантин	Утилитарное, торчевое	Кофе в таблетках. Можно пить так, можно толочь и нюхать. Можно закидывать вместе с нормальными стимуляторами, чтоб усилить действие. В очень больших дозах вызывает стимуляторный психоз.	Антагонист аденозиновых рецепторов	Стимуляция	Бессонница, тахикардия		2 2	50	500	2	4	Слабая		Легко ?	Легко	?	
Йохимбин	Стимулятор	 ?	Утилитарное, торчевое	Средство для потенции, афродизиак, кроме того используется какками. Алкалоид йохимбе (внезапно). Дает неприятную стимуляцию, более телесную чем умственную, в отличие от кофеина и ноотропов. Расширяет сосуды.	Антагонист альфа-2 адренорецепторов, антагонист 5-HT 1, 5 HT 2, D2, D3	Стимуляция, повышение либидо	Бессонница, тахикардия, судороги, головная боль		2 2	5	20	2	4	Нет или неизвестно		Средне ?	?	?	
Фенилпирacetам <i>Фенотропил, Нанотропил</i>	Стимулятор	 Рацетам	Утилитарное, торчевое	Ноотропное средство. Дает слабую стимуляцию, более умственную чем телесную. Кросс-толер с другими рацетами. Можно пить курсами. Вроде как может разгонять другие вещества. Стоит недешево.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		2 2	100	500	3	5	Нет или неизвестно		Легко ?	Нет в аптеках	?	
Омберacetам <i>Ноопепт</i>	Стимулятор	 Рацетам	Утилитарное, торчевое	Похоже на фенотропил. Нужно занюхивать, так как перорально не усваивается. Какой идиот придумал выпускать это в таблетках - непонятно.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		2 2	20	40	3	5	Нет или неизвестно		Без рецепта ?	?	?	
Прамирацетам <i>UA: Прамистар</i>	Стимулятор	 Рацетам	Утилитарное, торчевое	Украинский ответ фенотропилу, в РФ не продается. Действует чуть дольше, а так все то же самое.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		2 2	600	1800	4	7	Нет или неизвестно		Нет в аптеках ?	Легко	?	
Пирацетам <i>Тиоцетам</i>	Стимулятор	 Рацетам	Утилитарное, торчевое	Самый слабый из ноотропов, с невыраженными эффектами. Лучше достать его более сильные производные.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		1 1	2000	8000	4	8	Нет или неизвестно		Легко ?	Легко	?	
Бетагистин <i>Бетасерк</i>	Стимулятор	 ?	Торчевое	Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужно нюхать, но очень жжет нос.	Ингибитор диаминооксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при занюхивании		1 X	50	100	1	2	Нет или неизвестно		Без рецепта	Без рецепта	Легко ?	

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
										RU	BY	UA	KZ							
Дифенгидрамин <i>Димедрол, Антигrippин, Левросо</i>	Делириант	Этаноламин 	Утилитарное, торчевое	Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Можно использовать как снотворное. Как и любое другое холиногвно, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева. Передозы смертельно опасны из-за кардиотоксичности. В делирии можно совершить потенциально опасные для жизни действия. При длительном употреблении в больших дозах вызывает деменцию. Категорически не рекомендуется к употреблению.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	2	100	700	5	10	Слабая		Легко	Без рецепта	?	?
Гиосцин <i>Бускопан</i>	Делириант	Тропан 	Торчевое	Действующее вещество дурмана в виде бутилбромида. Ходят слухи что его нужно курить как соль. Но инфы об употреблении мало.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	X	?	?	3	4	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Тропиамид <i>Тропикам</i>	Делириант	? 	Торчевое	Капли в глаза нос. Прет слабо. Примечательны тем что им кололись опиятные торчи, видимо от чесотки, после чего его внесли в списки несмотря на непручсть.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	X	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?
Циклопентолат <i>Цикломед, Циклоптик</i>	Делириант	? 	Торчевое	Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо. Капать от 4 капель. Действует относительно недолго, сравнительно с другими холинолитиками.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		2	X	2	8	4	8	Слабая		ПКУ	?	?	?
Атропин	Делириант	Тропан 	Торчевое	Царь всех холинолитиков и действующее вещество белладонны. Опять же капли, которые капают мимо глаз прямо в нос.	М-холинолитик	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		2	X	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	?
Дицикловерин <i>Триган-Д</i>	Делириант	? 	Торчевое	Тот же классический холинолитик. Обязательно отбивать от парацетамола холодной водой. Несколько лучше чем антигистамины.	М-холинолитик	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		2	X	?	?	?	?	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?	?
Дименгидрилат <i>Авиамарин, Драмина</i>	Делириант, Стимулятор	Этаноламин / ксантин 	Торчевое	Средство от тошноты и укачивания. В организме распадается на все тот же димедрол и 8-хлоротеофеллин, стимулятор типа кофеина. Стимулирует, не так хочется спать как от димедролла. Более кардиотоксичен чем многие другие холинолитики.	М-холинолитик, антигистамин, антагонист аденозиновых рецепторов	Морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	X	250	750	5	10	Слабая		Без рецепта	?	Без рецепта	?
Доксиламин <i>Донормил, Слипзон</i>	Делириант	Этаноламин 	Утилитарное, торчевое	В целом похоже на димедрол, только еще больше хочется спать, и действует значительно дольше. Продается как снотворное. Некоторые уверяют, что он обладает анксиолитическими свойствами.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	2	75	450	8	24	Слабая		Легко	Без рецепта	?	?
Хлоропирамин <i>Супрастин</i>	Делириант	? 	Утилитарное, торчевое	Еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Как снотворное довольно слабое.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	1	250	1750	4	6	Слабая		Без рецепта	?	?	?

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависи-мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
																RU	BY	UA	KZ	
Клемастин <i>Тавегил</i>	Делириант		Утилитарное, торчевое	И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		1	1	?	?	?	?	Слабая		Без рецепта	?	?	?
Тригексифенидил <i>Циклодол, Паркопан</i>	Делириант		Торчевое	Средство для купирования побочных нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что спиздить из ПНД.	M-холинолитик	Эйфория, седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		3	X	1	6	6	12	Сильная		ПКУ	?	?	?
Бипериден <i>Мендилекс</i>	Делириант		Торчевое	Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма. Инфы о нем мало, скорее всего что-то более близкое к центральному холинолитикам чем к антигистаминам.	M-холинолитик	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия		2	X	?	?	?	?	Слабая		Трудно	?	?	?
Гидроксизин <i>Атаракс</i>	Делириант, Нейролептик		Утилитарное, торчевое	Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное. Врачи почему-то очень любят его выписывать как снотворное и успокоительное, и некоторые даже говорят что им помогает. Имеет эффекты схожие с атипичными нейролептиками, только гораздо слабее.	M-холинолитик, антигистамин, альфа адреноблокатор, антагонист 5-HT 2, D2	Седация, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, гипотензия, тахикардия, аритмия		1	2	50	300	5	14	Слабая		Трудно	?	?	?
Прометазин <i>Пипольфен</i>	Делириант, Нейролептик		Утилитарное, торчевое	Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик, с более сильным привкусом нейролептиков, однако все еще слишком слабый для снятия с психозов. Самое мощное из антигистаминных снотворных. Популярен у американских негров как средство от опийной чесотки от кодеиновых сиропов.	M-холинолитик, антигистамин, альфа адреноблокатор, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D2, D3	Седация, овоощное состояние, морфы, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, гипотензия, тахикардия, аритмия		1	2	25	100	4	11	Слабая		Трудно	?	?	?
Бензидамин <i>Тантум Роза</i>	Делириант, Стимулятор	Индазол 	Торчевое	Порошок для пизды. Требуется отбивка, чтобы не жрать повареную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз.	Релизер дофамина, M-холинолитик	Стимуляция, морфы, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия		2	X	500	2500	5	24	Нет или неизвестно	Спирт	Без рецепта	?	Без рецепта	?
Амантадин <i>Мидантан, ПК-Мерц</i>	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Утилитарное, торчевое	Слабый диссоциатив. Помимо диссоциации дает неприятную стимуляцию и бессоницу. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей. Некоторые предлагают пить при СДВГ, но эффективности никакой.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, морфы, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	Трава, мускат, баклофен, алкоголь в больших дозах	3	1	300	2000	12	24	Слабая		Средне	?	?	?
Римантадин <i>Ремантадин</i>	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Торчевое	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за побочками.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, морфы, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	Баклофен, алкоголь в больших дозах	1	X	250	1500	12	24	Слабая		Без рецепта	?	Без рецепта	?





Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
																RU	BY	UA	KZ	
Мемантин <i>Мемантал</i>	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Торчевое	Относительно чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую диссоциацию. В некоторых репортах пишут что упарывались даже до k-hole. В больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана. В малых некоторыми используется как что-то типа стимулятора ноотропа.	NMDA антагонист, сигма агонист, D2 агонист	Диссоциация, стимуляция	Бессоница, тахикардия, задержка мочи, головокружение, запор, сужение зрачков	Трава, мускат, баклофен, алкоголь в больших дозах	4	2	30	200	18	50	Слабая		Средне	?	?	?
Декстрометорфан <i>Каффетин Колд, Тофф+; ВУ: Фармавек; UA: Миллистан Мультисимптомный, Цетло+</i>	Диссоциатив	Морфинан 	Торчевое	Каноничный диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдоэфедрином (подходят только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфрином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки). Грейпфрутовый сок усиливает эффект.	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория	Задержка мочи, тахикардия, головокружение, тошнота, расширение зрачков, чесотка	Трава, психоделики, мускат, баклофен, алкоголь в больших дозах, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, MDMA, ИМАО, трамадол, тапентандол, 5-НТР	5	X	100	1000	8	12	Слабая	КЩЭ + сода, холодная вода	Средне	Средне	Без рецепта	?
Флупиртин <i>Катадолон</i>	Диссоциатив	? 	Торчевое	Когда-то популярный препарат, ныне запрещен, хотя можно найти индийские аналоги. Действие странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM, только эффект короче. Гепатотоксичен.	Активатор калиевых ионных каналов	Диссоциация, седация, эйфория	Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, задержка мочи		4	X	300	900	1	2	Слабая		Нет в аптеках	?	?	?
Нефопам <i>Акупан</i>	Диссоциатив, Стимулятор	? 	Торчевое	Еще один слабый атипичный диссоциатив с непрямым действием на передачу глутамата. Помимо этого имеет эффект похожий на антидепрессанты, отбивает аппетит и дает неприятную стимуляцию. Широво стоит намного дороже таблеток, но в/м биодоступность раз в пять выше. В аптеках бывает редко, хотя препарат не то чтобы дохуя рецептурен.	Блокатор кальциевых ионных каналов, ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик	Диссоциация, стимуляция	Тошнота, задержка мочи, тахикардия, аритмия, расширение зрачков, бессоница, сухость во рту	Мускат, СИОЗС, трамадол, тапентандол, сибутрамин, DXM, MDMA, ИМАО, 5-НТР	3	X	60	180	8	14	Слабая		Трудно	?	?	?
Преноксдиазин <i>Либексин</i>	Диссоциатив	? 	Торчевое	Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке		1	X	500	1000	4	8	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Тилетамин <i>Золетил, Телазол</i>	Диссоциатив	Арилциклогексиламин 	Торчевое	Диссоциативный анестетик из той же группы что кетамин. Продается в виде ветеринарного комбинированного препарата, в который входит еще и короткодействующий транквилизатор, ломающий диссоциативный кайф, хотя тот плохо усваивается при интраназальном употреблении. Инфы мало, способ отбивки существует только в теории. Стоит дорого.	NMDA антагонист	Диссоциация	Головокружение, задержка мочи, судороги		3	X	10	100	7	13	Слабая		Ветаптека	?	Ветаптека	?








Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
																RU	BY	UA	KZ	
Глауцин <i>Бронхолитин, Бронхотон; ВУ: Глауентт, UA: Бронхолитин Таб</i>	Психоделик	Апорфин 	Торчевое	Второй компонент сиропов с эфедрином. Понижает давление, частично снимает побочки эфедрина. Вызывает обострение чувств и, в больших дозах, видения с закрытыми глазами. И по-видимому из-за него под бронхолитином так приятно дышать. Особо сильно не упорешься, так как способ разделения с эфедрином неизвестен.	Агонист 5-НТ 2А, альфа адреноблокатор, D1 антагонист	Эйфория, седация, психоделия, морфы, эмпатия	Расширение зрачков, зевота, головокружение	Трава	5	X	70	205	5	7	Нет или неизвестно		Трудно	?	Без рецепта	?
Эфавиренз	Психоделик	? 	Торчевое	Лекарство от ВИЧ, стоит дорого, брать под заказ или у индусов. Имеет известность среди южноафриканских торчей. Атипичный психоделик короткого действия, инфы о применении у наших ковбоев мало. Индуктор ферментов CYP2B6 и CYP3A4. Гепатотоксичен.	Агонист 5-НТ 2А, ГАМК А модулятор, ИОЗ серотонина и дофамина	Эйфория, седация, психоделия, морфы, красочные сновидения	Расширение зрачков, головокружение, тошнота, расстройство пищеварения, токсический гепатит		3	X	600	1800	1	2	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Кодеин <i>Пентанов, Терпинкод, Нурофен+</i>	Опиоид	Морфинан 	Торчевое	Каноничный аптечный опиат. В организме метаболизируется в морфин. Сейчас найти его в аптеках уже нереально, доставать в шопах. Внимание: смешивание опиоидов с ГАМК-депрессантами усиливает седативный эффект, опиоидные передозы могут быть смертельными.	Мю агонист, дельта агонист, каппа агонист	Эйфория, седация, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков	ГАМКи в больших дозах	5	X	50	300	4	6	Сильная	КЩЭ, холодная вода	ПКУ	?	?	?
Трамадол <i>Трамал, Залдиар</i>	Опиоид	Фенилпропиламин 	Торчевое	Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами. На малых дозах больше стимуляции, на больших седации. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома. Ретард версию нужно мелко крошить или разжевывать. Метаболизируется CYP3A4, так что возможно усиливается грейпфрутом.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков	Мускат, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, ГАМКи в больших дозах, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	5	X	100	300	4	8	Сильная		ПКУ	?	?	?
Тапентадол <i>Палексия</i>	Опиоид	Фенилпропиламин 	Торчевое	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол, только мощнее и приятнее. Можно толочь и нюхать. Кросс-толер с трамадолом.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков	Мускат, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, ГАМКи в больших дозах, ИМАО, DXM, MDMA, 5-НТР	5	X	50	200	4	8	Сильная		ПКУ	?	?	?
Тримебутин <i>Тримедат, Необутин; UA: Тримспа</i>	Опиоид	? 	Утилитарное, торчевое	Панацея от опиатных запоров, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты, но в основном просто расслабляет.	Мю агонист, М-холинолитик	Седация	Тошнота, сонливость		2	2	1000	2000	3	5	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Лоперамид <i>Имодиум</i>	Опиоид	? 	Утилитарное, торчевое	Вместе с АПФ-ингибиторами или хинидином проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Швепсом запивать после употребления, пить литр потихоньку на протяжении 2-3 часов. Дает слабые опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных.	Мю агонист	Седация	Запор, сонливость, гипотензия		1	2	40	100	10	48	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?









Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависи-мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
																RU	BY	UA	KZ	
Прегабалин <i>Лирика</i>	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфожорства. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально. Все габапентиноиды вызывают привыкание, не стоит принимать их чаще 1-2 раз в неделю во избежание зависимости. Толер от однократного приема сходит до нуля примерно за неделю, от многократного за две-три. Внимание: смешивание разных групп депрессантов (включая алкоголь, бутират) между собой или с опиатами усиливает эффект, и может приводить к передозу с комой, заклебыванию собственной блевотой или остановке дыхания.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Эйфория, седация, стимуляция, дисингибция, эмпатия, морфы, диссоциация	Сонливость, головокружение, судороги	Трава, баклофен или фенибут в малых дозах, ГАМКи и опиаты в больших дозах	5	X	150	900	9	17	Сильная		ПКУ	?	Трудно	?
Габапентин <i>Нейронтин, Катэна, Габагамма, Тебантин; UA: Габантин</i>	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	ГАМК депрессант непрямого действия, наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами, похожие на таковые от диссоциативов. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса-час, заедать жирным, запивать кислым. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Эстетам особенно ценится нейронтин. Самая легкая отмена из габапентиноидов, но лучше с этим все равно не играть, так как не забываем про киндлинг.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Седация, эйфория, дисингибция, диссоциация	Сонливость, головокружение, судороги	Трава, баклофен или фенибут в малых дозах, ГАМКи и опиаты в больших дозах	4	X	300	2400	6	10	Сильная		Средне	?	?	?
Баклофен	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	Классика ГАМКов. Больше стимулирует, меньше визуалит. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не догонять. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны, поэтому если комбинировать то только в минимальных дозах. Кросс-толер с фенибутом. Самая тяжелая отмена из габапентиноидов.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Дисингибция, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия, красочные сновидения	Сонливость, судороги, тошнота, боль в почках	Трава, алкоголь, ДХМ, мексантин, ГАМКи и опиаты в больших дозах	4	X	25	125	8	14	Очень сильная		Трудно	?	?	?










Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
										RU	BY	UA	KZ							
Фенибут <i>Анвифен, Ноофен, Стоп Стресс</i>	Депрессант	Габапентиноид 	Торчевое	Младший брат баклосана. Более эйфоричен и более похож на габу/лирику, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Лучшим производителем из оставшихся считается Белмед. Анвифен в капсулах и не так раздражает в капсулах. Тolerантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Эйфория, эмпатия, дисингибция, седация, красочные сновидения	Сонливость, тошнота, боль в желудке	Трава, алкоголь в малых дозах, ГАМКи и опиаты в больших дозах	4	X	500	3500	6	10	Сильная		Средне	Без рецепта	?	?
Гопантевая кислота <i>Гопантам, Пантогам; UA: Когнум</i>	Депрессант	? 	Торчевое	Какой-то дальний родственник фенибута и баклофена. Инфы пока мало. Возможно токсичен.	ГАМК-Б агонист	Седация	Сонливость, тошнота, нарушения метаболизма		2	X	?	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Легко	?	?	?
Толперизон <i>Мидокалм</i>	Депрессант	? 	Торчевое	Миорелаксант, возможно имеет торчевой потенциал, но никто пока не пробовал.	Блокатор потенциал-зависимых натриевых и кальциевых каналов, N-холинолитик	Седация	Головная боль, тошнота		2	X	?	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Средне	?	?	?
Зопиклон <i>Сомнол, Имован</i>	Депрессант, Галлюциноген	Циклопирролон 	Утилитарное, Торчевое	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов. Как и другие Z-drugs, пожалуй лучшие из доступных снотворных, несмотря на быстро набивающийся от них толер. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиноговну. Дает состояние похожее на сон наяву. Таблетки толочь и нюхать.	Селективный ГАМК-A агонист	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия		3	5	7,5	15	9	50	Сильная		ПКУ	?	?	?
Залеплон <i>Соната Адамед, Анданте</i>	Депрессант, Галлюциноген	Пиразолопиримидин 	Утилитарное, Торчевое	Как зопиклон, только с очень коротким действием и мощнее. То же по отношению к мухоморам, что DMT по отношению к псилоцибам. Несмотря на то что препарат не в списках, добыть его сейчас практически невозможно.	Селективный ГАМК-A агонист	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия		3	5	10	60	1	2	Сильная		Трудно	?	?	?
Золпидем <i>Санвал, Нитрест</i>	Депрессант, Галлюциноген	Имидазопиридин 	Утилитарное, Торчевое	Тот самый Эмбиен. Еще один Z-препарат, тоже мощный сонник с дикой помесью делириантных, психоделических и диссоциативных эффектов, но со средним временем действия. Он вроде как зарегистрирован, но на деле достать мало у кого получалось.	Селективный ГАМК-A агонист	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия		3	5	10	50	5	15	Сильная		Список III	?	?	?

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависи- мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹			
																RU	BY	UA	KZ
Алпразолам <i>Ксанакс, Золомакс</i>	Депрессант	Бензодиазепин 	Утилитарное, Торчевое	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Заказ по почте череват сгухой. Внимание: не нужно пытаться поторчать на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна, уменьшения тревоги, снятия с бэдов/паничек/передозов/серотонинового синдрома. Синдром отмены от бензов может быть смертелен.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость		1 5	0,25	1,5	5	8	Очень сильная		Список III	?	?	?
Диазепам <i>Реланиум, Валиум, Сибазон</i>	Депрессант	Бензодиазепин 	Утилитарное	Типичный бенз. Действует значительно дольше алпразолама.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X 5	5	15	16	44	Очень сильная		Список III	?	?	?
Феназепам	Депрессант	Бензодиазепин 	Утилитарное	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь. Покупать на площадках, и в отличие от других бензов бутылка может даже не настигнет твой анус на почте.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X 4	0,5	4	15	24	Очень сильная		ПКУ	?	?	?
Клоназепам <i>Клонопин</i>	Депрессант	Бензодиазепин 	Утилитарное, Торчевое	Типичный бенз, аналогично алпразоламу.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость		1 5	0,5	2	8	12	Очень сильная		Список III	?	?	?
Гидазепам <i>Диамидазепам</i>	Депрессант	Бензодиазепин 	Утилитарное	Слабый бенз долгого действия, доступный в украинских аптеках. Стоит недешево. Когда-то производился и в РФ, но теперь отсутствует, заказывать из Украины сейчас понятное дело не стоит.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X 3	250	500	40	52	Очень сильная		Нет в аптеках	?	Средне	?
Тофизопам <i>Грандаксин</i>	Депрессант	Бензодиазепин 	Утилитарное	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Есть мнение что эффекты можно списать на плацебо. Зато можно достать.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X 1	50	250	6	8	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Золазепам <i>Золетил, Телазол</i>	Депрессант	Пиразолодизаепинон 	Утилитарное	Второй компонент собачьего ширева из ветапек, что-то навроде бензов. Учитывая что компонентов в лекарстве поровну, а дозировки при пероральном употреблении у бенза гораздо ниже чем у диссоциатива, вероятно можно применять как анксиолитик игнорируя слабые диссовые эффекты.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X 3	2,5	20	5	12	Очень сильная		Ветаптека	?	Ветаптека	?

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависи-мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
																RU	BY	UA	KZ	
Фенобарбитал <i>Валокардин, Корвалол, Беллатаминал; UA: Барбовал</i>	Депрессант	Барбитурат 	Утилитарное	Наркотик для бабушек и звезд прошлого. Транквилизатор и анксиолитик, но в целом хуже чем бензю. Зато по доступной цене и отпускают без проблем. Желательно отбивать. Так же есть в таблетках беллатаминал с привкусом холиногнона, но их найти трудно. Зависимость от барбитуратов такая же как от бензодиазепинов, а возможно и хуже. Индуктор CYP ферментов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X	2	50	300	12	48	Очень сильная	Выпаривание	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта	Без рецепта
Этифоксин <i>Спрезам</i>	Депрессант	? 	Утилитарное	Как бы анксиолитик, но действие очень слабое. Еще что-то там делает с синтезом нейростероидов, возможно будет интересно любителям ноотропов.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X	1	50	200	6	8	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Кариспродол <i>Каризопродол, Сом</i>	Депрессант	Карбамат 	Утилитарное, торговое	Транквилизатор и миорелаксант, хотя в отличие от бензю им хоть как-то можно упороться. Однако, зависимость столь же сильная как от бензю. Заказывать у индусов. Теоретически могут посчитать производным нелегального мепробамата, но о кейсах с бутылкой не известно.	ГАМК-А модулятор, ИОЗ аденозина	Седация, уменьшение тревоги, опьянение, эйфория	Сонливость		1	2	350	700	3	6	Очень сильная		Нет в аптеках	?	?	?
Карбамазепин <i>Финлепсин</i>	Депрессант	? 	Утилитарное	Нормотимик. Дает неприятное оwoчное расслабленное состояние. Индуктор CYP ферментов. Внимание: не нужно пытаться торчать на нормотимиках, они для биполярников. Нормотимики сильно токсичны, большие дозы могут быть опасны. Сочетание нормотимиков с серотонинэргическими препаратами может приводить к серотониновому синдрому.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит		X	1	200	400	12	24	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Ламотриджин <i>Ламиктал, Сейзар</i>	Депрессант	? 	Утилитарное	Еще один нормотимик. Все так же токсичен.	Блокатор натриевых ионных каналов	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, тошнота, токсический гепатит		X	1	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Тизанидин <i>Сирдалуд, Тизалуд</i>	Депрессант	Имидазолин 	Утилитарное	Гипотензивное типа клофелина. Очень сильно понижает давление, дает оwoчную расслабленность. Вроде бы как возможны галлюцинации. Гепатотоксичен.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, брадикардия, гипотензия		X	1	2	8	2	5	Слабая		Легко	?	?	?
Ксилазин <i>Ксила</i>	Депрессант	? 	Утилитарное	Еще одно анестетическое ширево для ветеринарии. Гипотензивное, по эффектам аналогичен клофелину и тизанидину. Токсичен. При инъекционном употреблении можно сгнуть заживо прям как от крокодила, ня.	Агонист альфа-2 адренорецепторов	Седация, оwoчное состояние	Сонливость, брадикардия, гипотензия, тошнота		X	1	?	?	?	?	Слабая		Ветаптека			

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависи-мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
										RU	BY	UA	KZ							
Фабомотизол Афобазол	Депрессант		Утилитарное	Вроде бы анксиолитик, но на деле скорее всего пустышка как и грандаксин. Может быть можно использовать как снотворное. Также в некоторых исследованиях пишут про ингибирующие свойства в отношении MAO.	Агонист мелатониновых рецепторов, сигма агонист, ингибитор MAO-A	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость, головная боль		X	1	?	?	2	3	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Арипипразол Арипризол, Зилаксер	Нейролептик		Утилитарное	Мощный атипичный нейролептик. Снимается с психозов. Стоит дорого. Внимание: не нужно пытаться торчать на нейролептиках, они для купирования шизы и для сна. Сочетание нейролептиков с депрессантами повышает риск передоза и комы. Сочетание с серотонинэргическими веществами может приводить к серотониновому синдрому. Нейролептики сильно токсичны и могут вызывать серьезные нарушения метаболизма и гормонального фона.	Антагонист 5-HT 2, D2	Седация, овоощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	2	10	30	48	96	Слабая		Трудно	?	?	?
Алимемазин Тералиджен	Нейролептик		Утилитарное	Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помягче и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное.	Антигистамин, антагонист D2	Седация, уменьшение тревоги, овоощное состояние	Сонливость, головокружение, сухость во рту		X	2	20	80	6	12	Слабая		Трудно	?	?	?
Кветиапин Сероквель, Кетилепт	Нейролептик	Дибензотиазепин 	Утилитарное	Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как овоощающее успокоительное, но можно и снимается с дофаминовых психозов. Есть репорты, что дает яркие красочные сны.	Антигистамин, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D1, D2	Седация, уменьшение тревоги, овоощное состояние, красочные сновидения	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	2	50	300	7	20	Слабая		Трудно	?	?	?
Сульпирид Эглонил	Нейролептик		Утилитарное	Нейролептик, якобы с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Противорвотное.	Антагонист 5-HT 2, D2, D3		Бессонница, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	1	200	800	4	8	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Метоклопрамид Церукал	Нейролептик		Утилитарное	Противорвотное. Вроде как можно использовать в качестве легкодоступного нейролептика.	Антагонист D2		Расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	1	?	?	3	6	Нет или неизвестно		Легко	?	?	?
Флуоксетин Прозак	Антидепрессант		Утилитарное	Самый доступный из антидепрессантов. Принимать курсом, как и все СИОЗС. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и агитацию. Внимание: сочетание разных групп антидепрессантов между собой или с некоторыми другими серотонинэргическими веществами (MDMA, DXM, трамадол, 5-HTP, и прочие) приводит к тяжелому серотониновому синдрому, возможен летальный исход. Антидепрессанты могут парадоксально усилить суицидальные мысли.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	2	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависи-мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
															RU	BY	UA	KZ	
Пароксетин <i>Паксил</i>	Антидепрессант		Утилитарное	Примерно то же что и флуоксетин, но помощнее и еще и со слабыми антигистаминными эффектами.	СИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	2	20	60	Принимать курсом	Слабая	Трудно	?	?	?	
Сертралин <i>Золофт</i>	Антидепрессант		Утилитарное	Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с пароксетином, но немного поприятнее и с менее жесткой отменой.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	2	50	200	Принимать курсом	Слабая	Трудно	?	?	?	
Флувоксамин <i>Феварин</i>	Антидепрессант		Утилитарное	И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	2	50	300	Принимать курсом	Слабая	Трудно	?	?	?	
Эсциталопрам <i>Селектра, Ципралекс</i>	Антидепрессант		Утилитарное	Тоже селективный ингибитор обратного захвата серотонина, отличается меньшей частотой возникновения побочек.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	2	10	20	Принимать курсом	Слабая	Трудно	?	?	?	
Венлафаксин <i>Велаксин</i>	Антидепрессант		Утилитарное	Вроде как один из лучших имеющихся стимулирующих антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упарывать в больших дозах. Сильный синдром отмены, по сравнению с другими антидепами.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	3	75	225	Принимать курсом	Сильная	Трудно	?	?	?	
Дулоксетин <i>Симбалта</i>	Антидепрессант		Утилитарное	Что-то наподобие венлафаксина, тоже один из лучших имеющихся стимулирующих антидепрессантов.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	3	60	120	Принимать курсом	Сильная	Трудно	?	?	?	
Милнаципран <i>Иксел</i>	Антидепрессант		Утилитарное	Тоже СИОЗСН, но в аптеках нет, заказывать как обычно у перекупов индийского.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либидо, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	3	50	200	Принимать курсом	Сильная	Нет в аптеках	?	?	?	
Селегелин <i>Депренил, Элдеприл</i>	Антидепрессант	Фенетиламин 	Утилитарное, торчевое	Один из немногих еще доступных ИМАО. Селективен к MAO-B, но в больших дозах ингибирует и MAO-A, возможно разгоняет психоделики (но это не точно). Одним из метаболитов является левометамфетамин. Используется для лечения СДВГ. Внимание: эффект приема ИМАО может сохраняться в течение пары недель.	Ингибитор MAO-B	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	Амфетамины, СИОЗС, DXM, MDMA, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-HTP, трамадол, тапентадол, ТЦА	1	3	?	?	2	4	Нет или неизвестно	Нет в аптеках	?	Трудно	Нет в аптеках

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч		Зависи-мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
																RU	BY	UA	KZ	
Транилципромин	Антидепрессант	Фенэтиламин 	Утилитарное, торчевое	Неселективный ИМАО. Достается у индусов, как и селегелин. Вроде как тоже метаболизируется во что-то амфетаминовое и разгоняет.	Ингибитор MAO, релизер дофамина	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, диарея	Амфетамины, СИОЗС, DXM, MDMA, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-HTP, трамадол, тапентадол, ТЦА	1	3	?	?	2	3	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	?	?	?
Амитриптилин	Антидепрессант, Делириант	? 	Утилитарное, торчевое	Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно овоцит. Можно упарывать как холинолитик.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, овожное состояние, морфы, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия	5-HTP, ИМАО	1	2	50	300	18	46	Слабая		Трудно	?	?	?
Кломипрамин Анафранил	Антидепрессант, Делириант	? 	Утилитарное, торчевое	Еще один трициклик холинолитик для любителей спать сутками, более мощный и с большим количеством побочек.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, мания, овожное состояние, морфы, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия, нарушения метаболизма	5-HTP, ИМАО	1	2	25	150	19	54	Слабая		Трудно	?	?	?
Имипрамин Мелипрамин	Антидепрессант, Делириант	? 	Утилитарное, торчевое	И еще ТЦА, вроде бы с меньшим количеством холиновых эффектов и более стимулирующий чем овоцащий.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, мания, овожное состояние, морфы, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия	5-HTP, ИМАО	1	3	75	250	8	24	Слабая		Трудно	?	?	?
Досулепин Дотиепин	Антидепрессант, Делириант	? 	Утилитарное	Индийский ТЦА, для не таких как все. Овердозами пить не выйдет из-за сильной токсичности.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, овожное состояние	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия, токсический гепатит	5-HTP, ИМАО	X	2	?	?	15	45	Слабая		Нет в аптеках	?	?	?
Миртазапин Каликста	Антидепрессант, Галлюциноген	Пиперазиноазепин 	Утилитарное, торчевое	Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько овоцащий. От долго применения жиреют из-за повышенного аппетита. Мощное снотворное. Дает видения с закрытыми глазами похожие на диссовые, и в больших дозах оказывает странное галлюциногенное действие.	Антагонист 5-HT 2, каппа агонист, антагонист альфа-2 адренорецепторов, М-холинолитик, антигистамин	Седация, гипнагогия, морфы, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение, сужение зрачков	5-HTP, ИМАО	2	3	45	270	14	24	Слабая		Трудно	?	?	?
Тразодон Триттико	Антидепрессант, Делириант	Фенилпиперазин 	Утилитарное, торчевое	Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афродизиака. Может быть можно использовать для стока. Овоцит значительно меньше чем трициклики, но все равно можно использовать как снотворное.	Антагонист 5-HT 2, ИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, повышение либидо	Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота, сухость во рту	5-HTP, ИМАО	1	3	75	600	3	9	Нет или неизвестно		Трудно	?	?	?
Родиола розовая	Антидепрессант	? 	Утилитарное	Водно-спиртовой экстракт. Содержит алкалоиды, неселективно ингибирующие моноаминоксидазу. Вероятно может разгонять психоделики, но инфы о применении мало.	Ингибитор MAO	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, гипертензия, головная боль	СИОЗС, DXM, MDMA, сибутрамин, мускат, нефопам, трамадол, тапентадол, ТЦА, 5-HTP	X	2	?	?	?	?	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
5-Гидрокситриптофан 5-HTP	Антидепрессант	Индоламин 	Утилитарное	Продается как биодобавка. Проходит ГЭБ и превращается в серотонин. Имеет слабый антидепрессивный эффект. В больших дозах могут быть легкие морфы и трейсеры. Некоторые пьют его в дни после приема МДМА чтобы облегчить отхода, но вообще различные сочетания опасны серотониновым синдромом.	Прекурсор серотонина	Стимуляция, седация, красочные сновидения	Изожа, тошнота, диарея, тахикардия, сонливость	СИОЗС, ТЦА, ИМАО, DXM, MDMA, сибутрамин, нефопам, мускат, трамадол, тапентадол	X	2	100	500	2	4	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Торч группа ³	Описание	Фарм действие	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг			Время действия, ч		Зависи- мость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹			
																	RU	BY	UA	KZ
Мелатонин	Антидепрессант	Индоламин 	Утилитарное	Еще одна биодобавка. Вырабатывается в организме естественным образом, регулирует циклы сна. Биодоступность низкая, лучше рассасывать таблетки под языком. Используется как слабое снотворное, вызывает очень яркие сны.	Агонист мелатониновых рецепторов	Седация, красочные сновидения	Тошнота, головная боль		X	2	3	9	6	10	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?
Зверобой	Антидепрессант	?	Утилитарное	Трава с очень слабыми антидепрессивными свойствами. Содержит гиперичин и гиперфорин. Ингибирует MAO и дофамин-бета-гидроксилазу, фермент превращающий дофамин в норадреналин. Индуктор ферментов CYP3A4 и CYP2C9.	Ингибитор MAO, ингибитор ДБГ	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, гипертензия расстройств пищеварения	СИОЗС, DXM, MDMA, сибутрамин, мускат, нефопам, трамадол, тапентадол, ТЦА, 5-НТР	X	1	?	?	3	12	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?

1) Сверху обычным шрифтом указано непатентованное наименование химического вещества. Снизу *курсивом* указаны наименования патентованных препаратов этого вещества, в том числе комбинированные. Вещество может продаваться под непатентованным, либо под одним из торговых наименований. Для препаратов, продающихся в других странах кроме России, указаны префиксы: UA - Украина, BY - Беларусь, KZ - Казахстан. Например, для DXM это значит что Каффетин Колд и Тофф+ продаются в РФ, Фармавек продается в РБ, а Милистан и Цетло+ продаются в Украине.

2) Минутка википедического аутизма. Один препарат может принадлежать ко многим группам одновременно, но указывается одна или две, эффекты которых наиболее выражены. **Стимуляторы** увеличивают активность центральной нервной системы, способствуют психомоторному возбуждению. Один из трех основных классов психоактивных веществ наряду с депрессантами и галлюциногенами. Типичные эффекты включают уменьшение усталости и сонливости, улучшение фокуса, подавление аппетита, ускорение мышления, эйфорию. Побочные эффекты включают учащение сердцебиения, повышенное артериальное давление, повышенную температуру тела, сужение сосудов. **Антидепрессанты** являются подтипом стимуляторов, но вынесены в отдельную категорию. Эффекты антидепрессантов в целом похожи, но развиваются не сразу а по мере терапевтического приема, и эти вещества как правило представляют малый интерес с точки зрения торча. **Депрессанты** снижают активность в ЦНС, уменьшают возбуждение в различных областях мозга. Типичные эффекты включают седацию, подавление тревоги, дезингибирование, расслабление мышц и эйфорию. Побочные эффекты включают тошноту, снижение артериального давления, снижение частоты сердечных сокращений, угнетение дыхания. В высоких дозах могут вызывать полную анестезию. **Опиоиды** являются подтипом депрессантов, но вынесены в отдельную категорию. В отличие от других депрессантов, опиоиды воздействуют не на ГАМК систему, а на рецепторы эндорфинов. Типичные эффекты включают дополнительно подавление боли, подавление кашля, очень сильную эйфорию и визуалы с закрытыми глазами. Типичные побочные эффекты включают дополнительно засухоту, запор, сужение зрачков. Нейролептики являются еще одним подтипом депрессантов с отдельной категорией. Нейролептики представляют собой класс веществ, блокирующих дофаминовые и серотониновые рецепторы в мозгу, и в основном используются для лечения психоза, особенно при шизофрении. Типичные эффекты включают седацию, замедление мышления, апатию, подавление мотивации, анализа и фокуса. Типичные побочные эффекты включают экстрапирамидные симптомы, гиперпролактинемию и другие метаболические аномалии. Галлюциногены вызывают мощные изменения в восприятии, настроении и различных когнитивных процессах. **Галлюциногены** принципиально отличаются от стимуляторов и депрессантов - вместо того, чтобы просто усилить или ослабить существующие состояния сознания, они производят качественно уникальные состояния, в которых реальность воспринимается новым образом. Конкретно здесь категория "галлюциногены" присвоена веществам, которые не относятся однозначно к одному из трех основных подтипов галлюциногенов (психоделики, диссоциативы, делирианты) и обладают эффектами всех трех. **Психоделики** являются серотонинергическими галлюциногенами, которые вызывают измененное состояние сознания, характеризующееся необычными изменениями в восприятии, настроении и когнитивных процессах. Типичные эффекты включают визуалы с открытыми и закрытыми глазами, искажение времени, усиление чувств, усиление самоанализа, концептуальное мышление, эйфорию и потерю эго. Побочные эффекты кроме расширенных зрачков являются редкими, но возможны неблагоприятные психологические реакции (тревога, бред, психоз). **Диссоциативы** - это класс галлюциногенов, который работает, блокируя NMDA рецепторы глутамата. Вещества этого класса характеризуются искаженными сенсорными восприятием и чувством отключения или отрешения от окружающей среды и себя. Феноменология часто описывается с точки зрения уменьшения или блокировки сигналов в сознательный разум из других частей центральной нервной системы. Типичные эффекты во многом похожи на психоделики, но также включают изменения в восприятии гравитации, подавление тактильных ощущений, анальгезию и, в высоких дозах, полную анестезию. Побочные эффекты также включают потерю моторного контроля, угнетение дыхания и задержку мочи. **Делирианты** представляют собой подкласс галлюциногенов, которые работают посредством антихолинергической активности. Они имеют уникальное свойство производить неотличимые от реальности галлюцинации, интегрированные в нормальное восприятие. Наиболее распространенные темы для этих галлюцинаций включают в себя повседневные случаи типа курения фантомных сигарет, разговор с людьми, которых на самом деле нет, насекомых, призраков, демонов и другие кошмары. Типичные побочные эффекты включают тахикардию, аномальный ритм сердца, гипертермию, сухость во рту, беспокойные ноги, частое мочеиспускание, сонливость, восприятие тяжести тела, амнезию, беспомощность, растерянность, паранойю и дисфорию.

3) Утилитарные вещества являются психотропами так же как и торчевые, но плохо подходят для приема в высоких дозах с целью получения каких-то положительных приятных эффектов. Однако, они могут полезны для снятия побочных эффектов других препаратов и лечения разного рода психических отклонений (СДВГ, депрессия, ОКР, тревога, психоз, бессоница, и прочее).

4) Стимуляция - ощущение энергичности, бодрости, мотивации выполнять какие-либо задачи, желания двигаться, ускорение мыслей. Седация - ощущение расслабленности, нежелание двигаться и работать, замедление мыслей. Опьянение. Уменьшение тревоги - ослабление негативных эмоций, раздражения, страха. Эйфория - ощущение комфорта, удовлетворения, благополучия, приподнятого настроения, восторга, радости, счастья. Эмпатия - усиление чувства сопереживания и любви к другим людям, желания и способности общаться, снижение страхов связанных с социальными ситуациями. Дисингибция - склонность к импульсивному поведению и немедленному удовлетворению потребностей, ориентация на текущие мысли и внешние раздражители, подавление эмоциональной сдержанности, безрассудство, плохая оценка риска и игнорирование социальных соглашений. Гипнагогия - красочные реалистичные видения с закрытыми глазами, похожие на осознанные сны; видения от опиатов обычно называются дремами. Морфы - искажения зрительного восприятия, при которых поверхности и текстуры кажутся движущимися и текущими, а формы объектов произвольно гнутся и меняются. Галлюцинации - восприятие объектов, которых на самом деле не существует; могут быть зрительными, слуховыми, тактильными. Делирий - полная дезориентация, потеря способности отличать галлюцинации от реальности. Диссоциация - чувство отстраненности от реальности и самого себя, притупление тактильных ощущений и чувства своего тела, видения с закрытыми глазами (включающие полеты по тоннелям, сложные детализированные структуры, внетелесный опыт, восприятие параллельные реальности), аудио-визуальные искажения, и другие измененные состояния сознания. Психоделия - усиление чувств, обострение восприятия, искажение восприятия времени, склонность к самоанализу и концептуальному мышлению, видения с закрытыми глазами (как правило абстрактная геометрия), и другие измененные состояния сознания. Красочные сновидения - повышение частоты возникновения сновидений, их длительности, яркости, интенсивности переживаний в них; так же повышение вероятности осознанных снов. Овощное состояние - подобно седации, но вместо приятного расслабления это просто неспособность нормально мыслить, фокусироваться, испытывать эмоции, и заниматься какой-либо деятельностью. Мания - подобно стимуляции, но вместо приятной энергичности это просто агитация, неспособность найти себе место, нервозность. Повышение либидо - усиление полового влечения.

5) Тахикардия - увеличение частоты сердечных сокращений. Брадикардия - уменьшение частоты сердечных сокращений. Аритмия - все прочие нарушения сердечного ритма. Гипертензия - повышенное артериальное давление. Гипотензия - пониженное артериальное давление. Вазоконстрикция - сужение сосудов. Гипертермия - повышение температуры тела. Тяжесть - чувство того что тело стало значительно тяжелее, трудность в перемещении, усталость. Амнезия - потеря памяти, обычно невозможность вспомнить то что происходило под действием вещества. Задержка мочи - невозможность или трудность мочеиспускания. Гормональные нарушения - от нейролептиков это обычно повышение уровня пролактина. Экстрапирамидные расстройства - дрожь в конечностях, спонтанные движения. Понижение либидо - уменьшение полового влечения, невозможность возбуждения и эрекции.

6) Комбинации с другими веществами. **Зеленым** выделены хорошие, годные комбинации. **Оранжевым** обозначены потенциально опасные, нужен осторожный подход. **Красным** выделены те, от которых почти наверняка будет гроб, гроб, кладбище, пидор.

7) Рейтинг по шкале от 1 до 5, первый для торчевого применения, второй для утилитарного. Все оценки субъективны, и выдаются на основании моего личного опыта, опытов анонов из треда, и трип-репортов которые могут быть найдены онлайн. Учитываются как эффекты так и побочки. Относитесь к оценкам торчевых веществ как к вероятности того что вам это вещество понравится (5 - нравится очень многим, выраженные эффекты, мало побочек; 4 - нравится большинству; 3 - 50/50; 2 - очень на любителя, слабые эффекты, сильные побочки; 1 - нравится совсем мало кому), к оценкам утилитарных веществ как к вероятности того что вам это вещество будет полезно для решения каких-то врожденных или возникших от употребления проблем (5 - что-то такое лучше всегда иметь в домашней аптечке; 4 - полезная вещь, но не самая сильная; 3 - ситуативно может пригодиться или полезно при определенных проблемах; 2 - ситуативно полезно, но слабые эффекты или выраженные побочки; 1 - в большинстве случаев бесполезно)

8) Дозировки указываются без учета толерантности, на среднего человека. Всегда нужно начинать принимать неизвестное вещество в минимальных дозах, масса тела, особенности метаболизма и чувствительность рецепторов у всех разная. Максимальные дозы могут быть опасны, особенно справедливо для делириантов, хотя у стимуляторов есть риск опасных сердечно-сосудистых побочек, а передозы депрессантов могут приводить к коме и остановке дыхания. Дозировки с высоким толером могут быть значительно больше чем указанные, поэтому не стоит удивляться если кто-то в треде пишет что упарывает конские дозы. Время действия так же может сильно меняться в зависимости от параметров организма.

9) Если у препарата указано "**нет или неизвестно**", это лишь значит что случаи возникновения зависимости настолько редки, что инфу о них трудно найти. **Слабая** - на препарат тяжело подсесть (в силу того что у него долго набивается и быстро падает толерантность), либо из-за неприятных эффектов не возникает желания употреблять повторно или часто, либо подсесть легко но легко и бросить (слабо выраженный синдром отмены). **Сильная** - на препарат легко подсесть и тяжело бросить, синдром отмены крайне неприятный. **Очень сильная** - на препарат легко подсесть и тяжело бросить, синдром отмены не просто неприятный, но и очень долгий (может длиться месяцами) и сопровождается рядом потенциально опасных симптомов психического (делирий, психоз, суицидальные мысли) и физического (нарушения сердечного ритма, сильные судороги) характера.

10) **КЩЭ** (пример для DXM): Берем 50 мл воды комнатной температуры. Берем щелочь (NaOH) 8-10 г (примерно чайная ложка без горки) на каждые 200 мг декстрометорфана плюс еще 8г. Аккуратно добавляем щелочь в воду (не наоборот!) небольшими порциями, тщательно размешиваем. При растворении щелочи раствор сильно нагревается. Вливаем раствор щелочи в емкость А (пластиковая бутылка 1.5-2 литра), высыпая туда же гранулы из капсул тофф+, закрываем крышкой и взбалтываем. Жидкость помутнеет и окрасится в желтоватый, зеленоватый или другой цвет. Добавляем в емкость А еще 50 мл воды и взбалтываем до полного растворения (жидкость станет темно-коричневой или красноватой). Отмеряем 20-40 мл неполярного растворителя (нефрас, бензин галоша) и вливаем в емкость А. Закрываем крышкой и сильно трясем 5-10 минут. Позволяем отстояться до полного разделения слоев. Для лучшего разделения слоев можно поставить бутылку в ведро с горячей водой. После разделения слоев растворитель остается сверху. Прикрепляем к большому (20 мл) шприцу трубку и аккуратно вытягиваем растворитель. Пену между слоями можно сбить потряхиванием или нагреванием в горячей воде. Выливаем растворитель в емкость Б (пластиковая бутылка 0.5 литра). Повторяем шаги начиная с добавления растворителя еще 2-4 раза, только трясти уже можно не 5-10 а 2-3 минуты. Альтернативно процессу со шприцем, можно добавлять больше растворителя и сливать слой без растворителя переворачивая бутылку, через проделанную в крышке дырку, затыкая дырку рукой в резиновой перчатке когда останется один растворитель. После этого отмеряем 80 мл теплой воды и растворяем в ней 1 грамм лимонной кислоты (половина чайной ложки). Вливаем раствор лимонной кислоты в емкость Б. Закрываем крышкой и сильно трясем 3-5 минут. Позволяем отстояться до полного разделения слоев. После разделения слоев раствор лимонной кислоты остается снизу. При помощи шприца с трубкой аккуратно вытягиваем нижний слой. Вливаем раствор в емкость В. Альтернативно, сливаем через дырку. Растворитель сохраняем для дальнейшего использования. Выпариваем остатки бензина из раствора, употребляем.

КЩЭ + Сода: Все аналогично предыдущему примеру, но вместо выпаривания проделываем дополнительные манипуляции. Берем 3-4 грамма кальцинированной соды (карбонат натрия, Na₂CO₃), 3 грамма это примерно 1 чайная ложка. Добавляем карбонат натрия в емкость В и тщательно размешиваем. Раствор мутнеет, затем в нем выпадают в осадок белые хлопья. Ставим емкость В в морозильную камеру на 15-20 минут. Медленно размораживаем раствор. Готовим шприц с фильтром-ватой, намотанной на иглу или носик шприца. Аккуратно вытягиваем жидкость шприцом и выливаем. В емкости остается белый или сероватый осадок - декстрометорфан-основание.

Холодная вода (для кодеина): Расталкиваем таблетки в мелкий порошок. Высыпая в стакан, заливаем горячей (но не кипящей) водой, примерно в 10 раз больше чем порошка. Тщательно мешаем. После этого ставим в холодильник и ждем пока остынет, должно будет выпасть значительное количество осадка. Отфильтровываем через марлю или кофе-фильтр, осадок остается на фильтре, это парацетамол, его выбрасываем. Отфильтрованный раствор выпариваем, полученные кристаллы соскребаем, это кодеин.

Спирт (для бензидамина): Берем рюмку, высыпая туда пакет розы. Заливаем ледяным спиртом или водкой из морозилки полную рюмку. Мешаем пару минут. Ждем когда осадок опустится на дно. Аккуратно сливаем спирт в другую тару, осадок выбрасываем (это соль). Повторяю процедуру с мешанием и осаждением 1-2 раза. После этого выпариваем. Ставим кастрюлю с водой на плиту, на нее широкую плоскую тарелку вместо крышки. Выливаем на тарелку спиртовой экстракт, при необходимости подливаем в процессе выпаривания. Ждем пока спирт почти весь испарится, после чего снимаем тарелку и оставляем пока не испарятся остатки спита. Получаем на тарелке кристаллы, соскребаем в порошок, это бензидамин.

Выпаривание (для фенобарбитала): Вливаем корвалол на большой поднос и оставляем в хорошо проветриваемом помещении. Ждем пока не останутся сухие белые кристаллы, соскребаем их, это фенобарбитал. Чтобы получить значительное количество фенобарбитала придется повторять несколько раз.

11) **Без рецепта** - препарат официально продается без рецепта. **Легко** - препарат формально продается по рецепту, но его почти никогда не спрашивают. **Средне** - препарат продается по рецепту, и у вас его могут спросить, возможно придется обойти несколько аптек пока продадут. **Тяжело** - препарат продается по рецепту, и его почти всегда спрашивают и часто отказывают при его отсутствии, возможно придется обойти большое количество аптек, или заказывать препарат онлайн. **ПКУ** - препарат на строгой учетности и его не продадут ни в какую, нужны поддельные рецепты, и такие препараты имеются лишь в малом количестве аптек. **Список III** - оборот препарата ограничен, в целом то же что и ПКУ, но аптек торгующих ими еще меньше. **Список I/II** - оборот препарата запрещен, получить можно только нелегально. За заказ препаратов из списков психотропных и наркотических веществ по почте у барыг может быть уголовка, при приминалове на кладе аналогично. За заказ препаратов ПКУ не из списков может быть административка или уголовка, если вам пришлют особо крупный размер с целью распространения. За перепродажу списковых препаратов так же будет уголовка. **Нет в аптеках** - препарат не запрещен и не ограничен, но официально не продается, и как правило заказывается онлайн в магазинах, торгующих зарубежной фармой и БАДами. **Ветаптека** - препарат заказывается онлайн в магазинах, снабжающих ветеринарные учреждения.

12) Здесь и далее, эффекты, способные в комбинациях между собой вызывать серотониновый синдром, выделены красным. Симптомы серотонинового синдрома: очень высокая температура с лихорадкой, очень высокий пульс и давление, судороги, тремор, произвольные движения, агитация, спутанное сознание, бессонница. Длится от 1 до 3 суток, в тяжелых случаях может быть смертелен, спасают только бензодиазепины.