


КОВБОЙСКАЯ ФАРМАКОПЕЯ

Справочник психоактивных лекарственных средств



















Редакция двадцатая (v020) от 31.07.2024 г.

*Карательная психиатрия работает лучше, когда карающий психиатр - ты сам
Устрой себе ознакомительный курс по веществам*








Бред+

Аптечных ковбоев тред






Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶			Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹					
								☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг				RU	BY	UA	KZ		
Эфедрин	Стимулятор	Фенэтиламин 	Настоящий амфетаминоподобный стимулятор. Алкалоид эфедры. Продается в виде крайне противных на вкус травяных сиропов, которые помимо прочего содержат глаучин, перекрывающий часть побочек и тоже обладающий психоактивными свойствами. Используется какими, в теории так же можно применять для похудения или от СДВГ. Пить как есть, не отбивая, если вы только не собрались варить винт, ну или вас тошнит от поглощения неприятных на вкус жидкостей. Начинает действовать через полчаса, но время действия обычно недолгое. Сильно сужает сосуды. Эфедрин и псевдоэфедрин выводятся с мочой в неизмененном виде. Внимание: стимуляторы могут вызывать тахикардию, гипертензию, вазоконстрикцию. Сердчикам пить с осторожностью. Для купирования побочек есть магний и ниацин¹².	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория, понижение аппетита	Бессоница, вазоконстрикция, тахикардия, гипертензия, температура	Амфетамины, х-NBOMe, DO-x, иломея, ИМАО	5	3	55	115	4	9	Слабая	КЩЭ	Трудно	?	без рецепта ?
Бронхолитин, Бронхотон		Фенэтиламин 	Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и меньше эйфории. Сильно разгоняет сердце и сужает сосуды, как и эфедрин. Купается в виде таблеток с DXM (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола, так как парацетамол чрезвычайно токсичен, и попытка жрать неотбитым обернется отказом печени. Способа разделить DXM и псевду пока не нашли.					5	3	100	200	4	9	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?
Псевдоэфедрин	Стимулятор	Фенэтиламин 	Похоже на эфедрин, но больше стимуляции, и меньше эйфории. Сильно разгоняет сердце и сужает сосуды, как и эфедрин. Купается в виде таблеток с DXM (которого там все равно мало), которые нужно отбивать от парацетамола, так как парацетамол чрезвычайно токсичен, и попытка жрать неотбитым обернется отказом печени. Способа разделить DXM и псевду пока не нашли.	Релизер дофамина и норадреналина	Стимуляция, эйфория, понижение аппетита	Бессоница, вазоконстрикция, тахикардия, гипертензия, температура	Амфетамины, х-NBOMe, DO-x, иломея, ИМАО	5	3	100	200	4	9	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?
Каффетин Колд		Фенэтиламин 	Средство для похудения, отбивает аппетит. Тоже нечто амфетаминоподобное. Дает неприятную стимуляцию, тряску, мазню, и прочие эффекты похожие на СИОЗС антидепрессанты. Возможно использование для СДВГ, но не слишком эффективное. Дорогое. За заказ средств кроме официально зарегистрированных в РФ будет бутылка, через границу перевозить так же нельзя.					ИОЗ серотонина ¹³ , норадреналина и дофамина	Стимуляция, понижение аппетита	Бессоница, тахикардия, аритмия, гипертензия, головная боль, тошнота, задержка мочи	Мускат, СИОЗС, трамадол, тапентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-HTP	3	4	15	60	6	10	Слабая
Сибутрамин	Стимулятор	Фенэтиламин 	Средство для похудения, отбивает аппетит. Тоже нечто амфетаминоподобное. Дает неприятную стимуляцию, тряску, мазню, и прочие эффекты похожие на СИОЗС антидепрессанты. Возможно использование для СДВГ, но не слишком эффективное. Дорогое. За заказ средств кроме официально зарегистрированных в РФ будет бутылка, через границу перевозить так же нельзя.	ИОЗ серотонина, норадреналина и дофамина	Стимуляция, понижение аппетита	Бессоница, тахикардия, аритмия, гипертензия, головная боль, тошнота, задержка мочи	Мускат, СИОЗС, трамадол, тапентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-HTP	3	4	15	60	6	10	Слабая	Нет в аптеках	?	?	?
Голдайн, Редуксин		Фенэтиламин 	Еще одно лекарство для жиробасов. Примечательно своей химической структурой, похожей на кофеин, хотя по эффектам скорее должно быть ближе к сибутрамину. Официально не продается, у спортпит-барыг стоит дорого, омичами не исследовано.					ИОЗ серотонина, норадреналина и дофамина	Стимуляция, понижение аппетита	Бессоница, тахикардия, головная боль, тошнота, сухость во рту	Мускат, СИОЗС, трамадол, тапентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-HTP	3	4	?	?	?	?	Слабая
Тезофензин	Стимулятор	Фенилтропан 	Еще одно лекарство для жиробасов. Примечательно своей химической структурой, похожей на кофеин, хотя по эффектам скорее должно быть ближе к сибутрамину. Официально не продается, у спортпит-барыг стоит дорого, омичами не исследовано.	ИОЗ серотонина, норадреналина и дофамина	Стимуляция, понижение аппетита	Бессоница, тахикардия, головная боль, тошнота, сухость во рту	Мускат, СИОЗС, трамадол, тапентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-HTP	3	4	?	?	?	?	Слабая	Средне	?	?	?
Тезолайт		?	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и мажет, без эйфории. Стоит дорого, но у индусов можно заказать значительно подешевле. Есть мнение, что самая пиздатая именно страттера, а индусские варианты говно, но ее сейчас уже хуй найдешь в аптеках. Метаболизируется через CYP2D6.					ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота, задержка мочи	Нет или неизвестно	Нет или неизвестно	6	25	120	4	6	Нет или неизвестно
Атомоксетин	Стимулятор	?	Лекарство от СДВГ. Некоторые пьют в качестве ноотропа. Разгоняет и мажет, без эйфории. Стоит дорого, но у индусов можно заказать значительно подешевле. Есть мнение, что самая пиздатая именно страттера, а индусские варианты говно, но ее сейчас уже хуй найдешь в аптеках. Метаболизируется через CYP2D6.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, вазоконстрикция, тошнота, задержка мочи	Нет или неизвестно	3	4	?	?	?	?	Слабая	Средне	?	?	?
Страттера, Когниттера		?	Бензгидрил 					ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	Нет или неизвестно	Нет или неизвестно	10	100	400	5	5	Нет или неизвестно
Модифенил	Стимулятор	Бензгидрил 	Изначально лекарство от нарколепсии, подходит так же как более пиздатая замена атомоксетину или чтобы подолгу не спать. В России больше недоступен, и за попытку заказа у индусов скорее всего будет скуха. В Украине есть в виде чистого R-модифенила, в Казахстане покупается в магазинах для качков.	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	Нет или неизвестно	4	5	?	?	?	?	Слабая	Средне	?	?	?
UA: Нуриджил		?	Как модифенил, только значительно слабее. В РФ не запрещен, но в аптеках не продается, покупать в интернете или как БАД для качков. Инфы о применении нет.					ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	Нет или неизвестно	Нет или неизвестно	?	3	4	?	?	Нет или неизвестно
Гидрафенил	Стимулятор	?	?	ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	Нет или неизвестно	3	4	?	?	?	?	Слабая	Нет в аптеках	?	?	?
Флуоренол		?	?					ИОЗ дофамина и норадреналина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль	Нет или неизвестно	Нет или неизвестно	?	3	4	?	?	Нет или неизвестно





Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	⁷		Дозы ⁸ , мг	Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹					
								И	Х					RU	BY	UA	KZ		
Бупропион	Стимулятор		Еще один ныне запрещенный в РФ психостимулятор, считается прекурсором катинонов, были случаи наблюдения за попытку провезти. В других странах продается как антидепрессант, но также подходит для СДБГ и бросания курить. В очень больших дозах вызывает делирий.	ИОЗ дофамина и норадреналина, Н-холинолитик	Стимуляция, эйфория	Тахикардия, тошнота		4	5	150	300	8	12	Слабая		Список I/II	?	Трудно	Нет в аптеках
Кофеин	Стимулятор		Кофе в таблетках. Можно пить так, можно толочь инюхать, хотя в таком случае будет закладывать нос из-за наполнителя. Можно закидывать вместе с нормальными стимуляторами, чтобы усилить действие. В очень больших дозах вызывает стимуляторный психоз.	Антагонист аденоzinовых рецепторов	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, головная боль		3	3	50	800	2	4	Слабая		Легко	?	Легко	?
Йохимбин	Стимулятор		Средство для потенции, афродизиак, кроме того используется как кашками. Алкалоид йохимбе (внезапно). Дает неприятную стимуляцию, более телесную чем умственную, в отличие от кофеина и рацетамов. Расширяет сосуды.	Антагонист альфа-2 адренорецепторов, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D2, D3	Стимуляция, повышение либido	Бессонница, тахикардия, судороги, головная боль		3	3	5	20	2	4	Нет или неизвестно		Средне	?	?	?
Фенилпирацетам Фенотропил, Фонтурацетам Нанотропил, Актитропил	Стимулятор		Ноотропное средство. Дает слабую стимуляцию, более умственную чем телесную. Кросс-толеранс с другими рацетамами. Можно пить курсами. Фенотропил, как и прочие рацетамы, вроде бы как могут разгонять другие вещества, особенно стимины, но инфы об этом немного. Выводится в неизменном виде. Стоит недешево.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль, бессонница		3	3	100	500	3	5	Нет или неизвестно		Легко	?	Нет в аптеках	?
Омберацетам Ноопепт	Стимулятор		Похоже на фенотропил. Нужно занюхивать, так как перорально не усваивается. Какой идиот придумал выпускать это в таблетках - непонятно. Еще вроде можно рассасывать под языком.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль, бессонница		3	3	20	40	3	5	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	?	?
Прамирацетам UA: Прамистар	Стимулятор		Украинский ответ фенотропилу, в РФ не продается. Действует чуть дольше, а так все то же самое.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль, бессонница		3	3	600	1800	4	7	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	?	Легко	?
Пирацетам Тиоцетам	Стимулятор		Самый слабый из ноотропов, с невыраженными эффектами. Лучше достать его более сильные производные.	AMPA модулятор, релизер ацетилхолина	Стимуляция	Тахикардия, головная боль		1	2	2000	8000	4	8	Нет или неизвестно		Легко	?	Легко	?
IDRA-21	Стимулятор		Research chemical с эффектами наподобие фенотропила, только долгого действия. В аптеках в РФ не продается, но можно купить онлайн как БАД. Толком никем не опробован.	AMPA модулятор	Стимуляция	Головная боль		3	3	3	15	8	26	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	?	?	?
Бетагистин Бетасерк	Стимулятор		Дает интересное чувство ясности в голове и вроде как стимуляцию, хотя может это и плацебо. Нужнонюхать, но очень жжет нос. Рекомендуют отбивать от наполнителя выпариванием и закапывать, но и так все равно жжет.	Ингибитор диаминоксидазы	Стимуляция	Жжение слизистой при занюхивании		1	X	50	100	1	2	Нет или неизвестно		Без рецепта	Без рецепта	Легко	?
Бромантан Ладастен	Стимулятор		Родственник мидантана и мемантина, но без диссоциативных эффектов, а только со стимуляцией. В общем, штука для любителей ноотропов. В России когда-то производился под названием Ладастен, но давно уже пропал и неизвестно вернется ли. Однако, его все еще можно найти в онлайн магазинах торгующих БАДами.	ИОЗ серотонина, норадреналина и дофамина	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, аритмия	Мускат, СИОЗС, трамадол, талентадол, нефопам, DXM, MDMA, ИМАО, 5-HTP	3	3	50	250	6	10	Нет или неизвестно		Нет в аптеках	?	?	?






Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹			
									RU	BY	UA	KZ					
Дифенгидрамин Димедрол, Антигриппин, Левросо	Делириант	Этаноламин 	Классика холинолитиков. Продается в ампулах, либо в таблетках в смеси с другими веществами. Изредка можно найти чистый в таблетках. Можно использовать как снотворное. Как и любое другое холиноговно, не дает ничего, кроме мерзких ощущений, амнезии и палева. Передозы смертельно опасны из-за кардиотоксичности. В делирии можно совершить потенциально опасные для жизни действия. При длительном употреблении в больших дозах вызывает деменцию. Категорически не рекомендуется к употреблению.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков	1 3	100	700	5	10	Слабая	Легко	Без рецепта	?	?	
Гиосцин Бускопан	Делириант	Тропан 	Действующее вещество дурмана в виде бутилбромида. Ходят слухи что его нужно курить как соль. Но инфы об употреблении мало.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия	1 X	?	?	3	4	Слабая		Без рецепта	?	?	
Тропикамид Тропикам	Делириант	? 	Капли в нос. Прет слабо. Примечательны тем что им кололись опиатные торчи, видимо от чесотки, после чего его внесли в списки несмотря на непрочтесь.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия	1 X	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	
Циклопентолат Цикломед, Циклоптик	Делириант	? 	Еще одни капли для расширения зрачков. Вот эти уже прут хорошо. Капать от 4 капель. Действует относительно недолго, сравнительно с другими холинолитиками. В связи с интраназальным употреблением эффект возникает быстро и резко.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков	2 X	2	8	4	8	Слабая		ПКУ	?	?	
Атропин	Делириант	Тропан 	Царь всех холинолитиков и действующее вещество белладонны. Опять же капли, которые капают мимо глаз прямо в нос, хотя кто-то говорит что можно просто пить. Но лучше не нужно.	M-холинолитик	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков	2 X	?	?	?	?	Слабая		ПКУ	?	?	
Платифиллин	Делириант	? 	И еще один атропиноподобный препарат, продается в ампулах. Если верить инструкции, то по силе сравним с атропином и при этом дает меньше побочек чем атропин. Омичами похоже не изучен, да и вряд ли кто его будет изучать.	M-холинолитик	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков	2 X	?	?	?	?	Слабая		Средне	?	?	
Дицикловерин Триган-Д	Делириант	? 	Тоже классический холинолитик, и когда-то в прошлом излюбленное вещество школьников. Обязательно отбивать от парацетамола холодной водой, упаривание в неотбитом виде приведет к смерти от отказа печени. Несколько получше чем антигистамины.	M-холинолитик	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков	2 X	100	300	5	12	Слабая	Холодная вода	Средне	?	?	
Дименгидринат Авиамарин, Драмина	Делириант, Стимулятор	Этаноламин / ксанти ¹² 	Средство от тошноты и укачивания. В организме распадается на все тот же димедрол и 8-хлоротрофефлин, стимулятор типа кофеина. Стимулирует, не так хочется спать как от димедрола. Более кардиотоксичен чем многие другие холинолитики. От тошноты действительно помогает, блевануть под ним тяжело, что делает передозы еще более опасными.	M-холинолитик, антигистамин, антигонист аденоэзиновых рецепторов	Морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков	1 X	250	750	5	10	Слабая		Без рецепта	?	Без рецепта ?	
Доксиламин Донормил, Слипзон	Делириант	Этаноламин 	В целом похоже на димедрол, только еще больше хочется спать, и действует значительно дольше. Продается как снотворное. Некоторые уверяют, что он обладает анксиолитическими свойствами. Возможно так же меньше бьет по памяти, если использовать в качестве снотворного, но в отличие от многих других препаров, снотворный эффект может сохраняться утром.	M-холинолитик, антигистамин	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия, расширение зрачков	1 3	75	450	8	24	Слабая		Легко	Без рецепта	?	







Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹			
									RU	BY	UA	KZ					
Хлоропирамин Супрастин	Делириант		Еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Как снотворное довольно слабое.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия	1 2	250 1750	4	6	Слабая	Без рецепта	?	?	?		
Клемастин Тавегил	Делириант		И еще одно димедролоподобное средство от аллергии. Тысячи их.	М-холинолитик, антигистамин	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия	1 2 ?	? ? ?	?	?	Слабая	Без рецепта	?	?	?		
Тригексифенидил Циклодол, Паркопан	Делириант		Средство для купирования побочек нейролептиков. В отличие от прочих холинолитиков может давать приятные эффекты. Достать почти нереально, разве что спиздить из ПНД.	М-холинолитик	Эйфория, седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия	4 X	1 6 6 12	12	Сильная	ПКУ	?	?	?			
Бипериден Мендилекс	Делириант		Тоже препарат от нейролептической тряски и паркинсонизма. Инфы о нем мало, скорее всего что-то более близкое к центральным холинолитикам чем к антигистаминам.	М-холинолитик	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, тяжесть, амнезия, тахикардия, аритмия	2 X ?	? ? ?	?	?	Слабая	Трудно	?	?	?		
Гидроксизин Атапакс	Делириант, Нейролептик		Якобы анксиолитик, на самом деле нечто димедролоподобное. Врачи почему-то очень любят его выписывать как снотворное и успокойтельное, и некоторые даже говорят что им помогает, возможно снижает трясицу из-за адреноблокирующего действия. Имеет эффекты схожие с атипичными нейролептиками, только гораздо слабее.	М-холинолитик, антигистамин, альфа адреноблокатор, антагонист 5-HT 2, D2	Седация, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, гипотензия, тахикардия, аритмия	1 3	50 300 5 14	14	Слабая	Трудно	?	?	?			
Прометазин Пипольфен	Делириант, Нейролептик		Еще один димедролоподобный якобы анксиолитик, с более сильным привкусом нейролептиков, однако все еще слишком слабый для снятия с психозов. Самое мощное из антигистаминных снотворных. Популярен у американских негров как средство от опиатной чесотки от кодеиновых сиропов.	М-холинолитик, антигистамин, альфа адреноблокатор, антагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D2, D3	Седация, овощное состояние, морфи, галлюцинации, делирий	Сухость во рту, сонливость, тяжесть, амнезия, гипотензия, тахикардия, аритмия	1 3	25 100 4 11	11	Слабая	Трудно	?	?	?			
Бензидамин Тантум Роза	Делириант, Стимулятор		Индазол Порошок для пизды. Серьезно. Требуется отбивка, чтобы не хватать поваренную соль в огромных количествах. Действие странное, нехарактерное для холинолитиков, похожее больше на стимуляторный психоз. В других препаратах с бензидамином его содержитя слишком мало для упорки, поэтому покупаем именно розу. Бессонница может сохраняться двое суток, что только добавляет остроты ощущений.	Релизер дофамина, М-холинолитик	Стимуляция, морфи, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, тошнота	3 X	500 2500 5 24	24	Нет или неизвестно	Спирт	Без рецепта	?	Без рецепта	?		
Амантадин Мидантадин, ПК-Мерц	Диссоциатив, Стимулятор		Адамантан Немного диссоциатив. Помимо диссоциации дает неприятную стимуляцию и бессонницу. В больших дозах вызывает что-то вроде стимуляторного психоза как от солей, что помноженное на диссоциацию может давать интересные глюки с открытыми глазами. Некоторые предлагают пить при СДВГ, но эффективности примерно никакой. Внимание: диссоциативы могут вызывать НРРД и деперсонализацию-дереализацию. Диссоциативы так же не стоит мешать с депрессантами и опиоидами в больших количествах, так как это может угнетать дыхание и вызывать сильную рвоту.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, морфи, галлюцинации, делирий	Бессонница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота	4 1	300 2000 12 24	24	Слабая	Средне	?	?	?			

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
									RU	BY	UA	KZ						
Римантадин Ремантадин	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Еще более слабый диссоциатив. В целом похоже на мидантан, но значительно токсичнее. Трип можно не заметить за крайне мерзкими побочками вроде звона в ушах. Легкодоступное, но совершенно школьное вещество, больше смахивающее на токсикоманию.	NMDA антагонист, релизер дофамина, сигма агонист	Стимуляция, диссоциация, морфи, галлюцинации, делирий	Бессоница, тахикардия, температура, задержка мочи, тошнота, шум в ушах, головная боль	ГАМК или опиаты в больших дозах	1 X	250	1500	12	24	Слабая	Без рецепта	?	Без рецепта	?	
Мемантин Меманталь	Диссоциатив, Стимулятор	Адамантан 	Относительно чистый сильный диссоциатив. Дает холодную и очень долгую (до трех суток) диссоциацию. В некоторых отчетах пишут что упиралось даже до k-hole, хотя информация сомнительна, так как из-за стимуляции совсем вырубиться не получается. Некоторые сравнивают пиковое действие мемантана (длящееся 6-10 часов) с PCP или кетамином. Следующие пару дней как правило не дает ничего кроме легкого дисса с вертолетами и легкостью в теле. В больших дозах может давать дофаминовые побочки как у мидантана, с его стимуляторной шизой. Трава и мускат значительно усиливают визуальные эффекты, но такое сочетание может приводить к психозам. В малых дозах (20-40 мг) некоторыми используется как что-то типа стимулятора-ноотропа. По некоторым отчетам, сильные трипы на мемантине могут отменять толер к другим веществам или помогать от зависимости на какое-то время делая системное употребление некайфовых.	NMDA антагонист, сигма агонист, D2 агонист	Диссоциация, стимуляция	Бессоница, тахикардия, задержка мочи, головокружение, запор, сужение зрачков	ГАМК или опиаты в больших дозах	5 2	30	200	18	50	Слабая	Средне	?	?	?	
Декстрометорфан <i>Каффетин Колд, Тофф+; BY: Фармацевт; UA: Милистан Мультисимтомный, Цепло+</i>	Диссоциатив	Морфинан 	Канонический диссоциатив. Описывать можно бесконечно, курите DXM FAQ. Эра сиропов ушла, теперь добывается либо из таблеток с псевдоэфедрином (подходит только для низких плато), либо из таблеток с фенилэфирином (который отбивается плохо и может давать сильные побочки). В других странах попроще, и может быть нужна только отбивка от парацетамола. Грейпфрутовый сок (ингибитор фермента CYP3A4) усиливает эффект.	NMDA антагонист, ИОЗ серотонина, сигма агонист	Диссоциация, стимуляция, эмпатия, эйфория, улучшение восприятия музыки	Задержка мочи, тахикардия, головокружение, тошнота, расширение зрачков, чесотка	Трава, психоделики, мускат, ГАМК или опиаты в больших дозах, нефопам, сибутрамин, СИОЭС, MDMA, ИМАО, трамадол, тапентандол, 5-HTP	7 X	100	1000	8	12	Слабая	КЩЭ + сода, холодная вода	Средне	Средне	Без рецепта	
Флулиптирин <i>Катадолон</i>	Диссоциатив	?	Когда-то популярный препарат, ныне лицензия на выпуск отозвана, но в списки не входит и можно найти индийские аналоги. Действие странное, но вроде как похоже на низкие плато DXM, только эффект короче. Гепатотоксичен.	Активатор калиевых ионных каналов	Диссоциация, седация, эйфория	Тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, задержка мочи		4 X	300	900	1	2	Слабая		Нет в аптеках	?	?	?
Нефопам <i>Акупан; UA: Нефам</i>	Диссоциатив, Стимулятор	?	Еще один слабый атипичный диссоциатив с непрямым действием на передачу глутамата. Помимо этого имеет эффект похожий на антидепрессанты, отбивает аппетит и дает неприятную (хотя некоторым нравится) стимуляцию с тошнотой (в основном на входе) и низким разгоном сердца, особенно при физической активности. В целом несколько похоже на 1 плато DXM, подходит для того чтобы полежать позалипать в полетные визуалы и объемную музыку, но можно и погулять и подвигаться если сердце не шалит. Визуальные эффекты усиливаются в сочетаниях с другими диссоциативами. Кардиотоксичность и сушняки могут быть обусловлены склонностью молекулы к димедролом. Широко стоит намного дороже таблеток, но в/м биодоступность раз в пять выше. В аптеках бывает редко, хотя препарат не то чтобы дохуя рецептурен. Инъекционные формы как правило добьешь проще.	Блокатор кальциевых ионных каналов, ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик	Стимуляция, диссоциация, улучшение восприятия музыки, понижение аппетита, эйфория	Тошнота, тахикардия, аритмия, бессоница, задержка мочи, сухость во рту	Мускат, СИОЭС, трамадол, тапентандол, сибутрамин, DXM, MDMA, ИМАО, 5-HTP	4 X	60	180	8	14	Слабая		Трудно	?	?	?

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
										X				RU	BY	UA	KZ	
Преноксазин Либексин	Диссоциатив		Действие непонятное. Дает слабую диссоциацию и аудиторные галлюцинации. Сильные побочки, за которыми можно и пропустить трип.	Сигма агонист	Диссоциация, седация, галлюцинации	Сухость во рту, тошнота, боль в желудке		1 X	500	1000	4	8	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?	
Тилематин Золетип, Телазол	Диссоциатив		Арилциклогексиламин Диссоциативный анестетик из той же группы что кетамин. Продается в виде ветеринарного комбинированного препарата, в который входит еще и короткодействующий транквилизатор, ломающий диссоциативный кайф. Здесь приведены в/м дозировки тилематина, но кишке нужно в пять раз больше, но и действие будет 7-13 часов. Проблема только в том, что закинуться по кишке без отбивки не выйдет, так как получится передоз транком. Инфи мало, способ отбивки существует только в теории. Стоит дорого.	NMDA антагонист	Диссоциация	Головокружение, задержка мочи, судороги		4 X	2,5	20	2	5	Слабая	Вет аптека	?	Вет аптека	?	
Эфавиренз	Психоделик		Бензоксазин Лекарство от ВИЧ, стоит дорого, брать под заказ или у индусов. Имеет известность среди южноафриканских торчей. Атипичный психоделик очень короткого действия. Инфи о применении у наших ковбоев мало. Вспирает мощно, особо не визуализ, отпускает быстро, отходя тяжелые. В ночь после трипа вызывает очень реалистичные сновидения. Прием с жирной пищей значительно повышает биодоступность. Индуктор ферментов CYP2B6 и CYP3A4. Гепатотоксичен. Внимание: психоделики могут вызывать HPPD.	Агонист 5-HT 2A, ГАМК А модулятор, ИОЗ серотонина и дофамина	Психоделия, красочные сновидения, стимуляция, седация, эйфория, улучшение восприятия музыки	Головокружение, головная боль, тошнота, расстройства пищеварения, токсический гепатит, тахикардия, бессонница		4 X	600	1800	1	4	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?	
Глауцин Бронколитин, Бронхотон; BY: Глауверт, UA: Бронколитин Таб	Психоделик		Апорфин Второй компонент сиропов с эфедрином. Вещество из той же химической группы что и алкалоиды голубого лотоса. Понижает давление, частично снимает побочки эфедрина. Вызывает обострение чувств и, в больших дозах, видения с закрытыми глазами. И по-видимому из-за него под бронхолитином так приятно дышать. Особо сильно не упрежешься, так как способ разделения с эфедрином неизвестен, хотя пробовавшие чистый беларусский глаувент говорят что на высоких дозах все равно ничего интересного нет и полноценной психоделии с него не получить.	Агонист 5-HT 2A, альфа адреноблокатор, D1 антагонист	Эйфория, седация, психоделия, морфи, эмпатия, улучшение восприятия музыки	Расширение зрачков, зевота, головокружение	Трава	6 X	70	205	5	7	Нет или неизвестно	Трудно	?	Без рецепта	?	
Кодеин Пентанов, Терпинкод, Нурофен+	Опиоид		Морфинан Каноничный аптечный опиат. В организме метаболизируется в морфин через CYP2D6. Сейчас найти его в аптеках уже нереально, доставать в шопах. Таблетки комбинированные препараты как правило нужно отбивать, так как в них пацетамол. Внимание: смешивание опиоидов с ГАМК-депрессантами усиливает седативный эффект. Опиоидные передозы могут быть смертельны, при экспериментах с большими дозами желательно иметь трип-ситтера и налоксон. Опиоиды вызывают сильную зависимость.	Мю агонист, дельта агонист, каппа агонист	Эйфория, седация, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков, тошнота	ГАМК в больших дозах	5 X	50	300	4	6	Сильная	КЦЭ, холодная вода	ПКУ	?	?	?
Трамадол Трамал, Залдиар	Опиоид		Фенилпропилямин Опиоидный анальгетик с антидепрессивными свойствами, для тех кому не хватает теплоты и комфорта в этой жизни. На малых дозах больше стимуляции, на больших седации. Нельзя мешать с релизерами серотонина, во избежание серотонинового синдрома. Ретард версия нужно мелко крошить или разжевывать. Метаболизируется в активный метаболит через CYP2D6 и в неактивные через CYP3A4, так что возможна усиливается грейпфрутом. У людей с эпилепсией и при одновременном приеме нейролептиков может вызывать судороги.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков, тошнота	Габапентиноиды в малых дозах, мускат, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, ГАМКи в больших дозах, нейролептики, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	6 X	100	300	4	8	Сильная	ПКУ	?	?	?	

Вещество ¹	Фармгруппа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фармдействие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	★ ⁷	Дозы ⁸ , мг			Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹			
									RU	BY	UA				?	?	?	?
Тапентадол Палексия	Опиоид	Фенилпропилямин 	Тоже опиоидный анальгетик, очень похожий на трамадол, только намного мощнее и приятнее. Можно толочь и нюхать. Кросс-толер с трамадолом. Лучшее из оставшихся медленных кайфов, но возможно в скором времени попадет в списки и доставать станет очень проблематично.	Мю агонист, ИОЗ серотонина и норадреналина	Эйфория, седация, стимуляция, гипнагогия	Запор, чесотка, сужение зрачков, тошнота	Габапентиноиды в малых дозах, мускат, нефопам, сибутрамин, СИОЗС, ГАМКи в больших дозах, нейролептики, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	7 X	50	200	4	8	Сильная	ПКУ	?	?	?	
Тримебутин Тримедат, Необутин; UA: Тримста	Опиоид, Делириант	? 	Панацея от опиатных запоров, если принимать в терапевтических дозах, хотя и сам дает слабые опиатоподобные эффекты в дозах уже больших, но в основном просто расслабляет и дает неприятные эффекты аналогичные холиногону. К употреблению не рекомендуется, возможно токсичен при частом приеме.	Мю агонист, М-холинолитик	Седация, овощное состояние, морфи, галлюцинации	Тошнота, сонливость		1 3	1000	2000	3	5	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?	
Лоперамид Имодиум	Опиоид	? 	Вместе с АПФ-ингибиторами или хинидином проходит через ГЭБ, иначе не проходит. Швепсом записывать после употребления, пить литр потихоньку на протяжении 2-3 часов. Дает слабые опиатоподобные эффекты. Снимает ломку от медленных.	Мю агонист	Седация	Запор, сонливость, гипотензия		1 3	40	100	10	48	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	Без рецепта	?	
Прегабалин Лирика	Депрессант, Диссоциатив	Габапентиноид 	Кайф в капсулах. Лучшее из ГАМКов и эталон аптечного кайфокорства. Имеет непрямой эффект,цепляющий помимо ГАМК еще и NMDA. Есть так же мнение что может связываться с опиоидными рецепторами, так как иногда используется для снятия опиатных ломок, но подтверждения этому нет. Покупать на площадках, так как в аптеках сейчас добыть почти нереально. Брать желательно оригинальную pfizerовскую в капсулах, так как с нестандартными пачками и дозировками можно наткнуться на хуй пойми что. Все габапентиноиды вызывают привыкание, не стоит принимать их чаще 1-2 раз в неделю во избежание зависимости. Хотя некоторые их микродозят как средство от тревоги, несмотря на слабый эффект и быстро развивающийся толер. Толер от однократного приема в торцевой дозе сходит до нуля примерно за неделю, от многократного за две-три. Габапентиноиды выводятся с мочой в неизмененном виде. Внимание: смешивание разных групп депрессантов (включая алкоголь, бутират) между собой или с опиатами взаимоусиливает эффект, и может приводить к передозу с комой, захлебыванию собственной блевотой или остановке дыхания.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Эйфория, седация, дисингибация, стимуляция, эмпатия, морфи, диссоциация, улучшение восприятия музыки, уменьшение тревоги	Сонливость, головокружение, судороги	Трава, баклофен или фенибут в малых дозах, трамадол или палексия в малых дозах, ГАМКи и опиаты в больших дозах	7 3	150	900	9	17	Сильная	ПКУ	?	Трудно	?	
Габапентин Нейронтин, Катэна, Габагамма, Тебантин, Конвалис; UA: Габантип	Депрессант, Диссоциатив	Габапентиноид 	ГАМК депрессант непрямого действия, наподобие лирики, но в целом намного слабее. Дает немного эйфории и красочные видения с закрытыми глазами, похожие на такие от диссоциативов. Для максимальной биодоступности пить по одной пилюле раз в полчаса-час, заедать жирным, запивать кислым. Большие дозы, выпитые разом, просто не усваиваются. Эстетами особенно ценится нейронтин, катэна находится в средней ценовой категории, а канон это бюджетный вариант. Самая легкая отмена из габапентиноидов, но лучше с этим все равно не играться, так как не забываем про киндлинг. Есть исследования говорящие о высокой токсичности, у системщиков могут быть проблемы с отеками.	Блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Седация, дисингибация, диссоциация, эйфория, эмпатия, улучшение восприятия музыки, морфи, уменьшение тревоги	Сонливость, головокружение, боль в почках, судороги	Трава, фенибут в малых дозах, трамадол или палексия в малых дозах, алкоголь, ГАМКи и опиаты в больших дозах	6 2	300	2400	6	10	Сильная	Средне	?	?	?	

Вещество ¹	Фармгруппа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фармдействие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹				
									RU	BY	UA	KZ						
Баклофен	Депрессант	Габапентиноид 	Классика ГАМКов. Больше стимулирует, меньше визуалит. После употребления нужно подождать три часа пока препарат усвоится, и ни в коем случае не додгоняться. Передозы могут приводить к коме. Миксы с другими депрессантами в лучшем случае приведут к сильной блевоте, в худшем смертельно опасны, поэтому если комбинировать то только в минимальных дозах. Кросс-толер с фенибутом. Тяжелые отходы, самая тяжелая отмена из габапентиноидов. В последнее время много жалоб на то, что попадаются непрushing колеса.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Дисингибиция, седация, стимуляция, эйфория, эмпатия, уменьшение тревоги, красочные сновидения	Тошнота, сонливость, боль в почках, судороги	Трава, прегабалин или габапентин в малых дозах, алкоголь, DXM, мемантин, ГАМКи и опиаты в больших дозах	6	2	25	125	8	14	Очень сильная	Трудно	?	?	?
Фенибут Анвилен, Ноофен, Стоп Стресс	Депрессант	Габапентиноид 	Младший брат баклосана. Более эйфоричен и более похож на габу/лирику, но в целом слабее. На некоторых действует в малых дозах, некоторым нужно жрать огромные чтобы вперло хоть как-то. Так же как и баклофен, усваивается примерно через три часа. В ветаптеках продается под названием Стоп Стресс. Лучшим производителем из оставшихся считается Беллмед, лучшим вообще - Олайнфарм. Анвилен в капсулах и не так раздражает желудок, извещникам пить его или толочь таблетки и фасовать по пустым капсулям. Тolerантность развивается очень быстро. Кросс-толер с баклофеном.	ГАМК-Б агонист, блокатор потенциал-зависимых кальциевых каналов	Эйфория, эмпатия, дисингибиция, седация, уменьшение тревоги, красочные сновидения	Тошнота, боль в желудке, сонливость	Трава, алкоголь в малых дозах, прегабалин или габапентин в малых дозах, ГАМКи и опиаты в больших дозах	5	2	500	3500	6	10	Сильная	Средне	Без рецепта	?	?
Гопантеновая кислота Гопантам, Пантогам; UA: Когнум	Депрессант	Габапентиноид 	Какой-то дальний родственник фенибута и баклофена. Впирает относительно быстро, действие ощущается уже через час, но действует недолго. По эффектам перекос больше в сторону стимуляции чем эйфории, хотя есть и седация с тупнками, больше всего похоже на баклу. Визуалов нет. По некоторым исследованиям токсичен, но по ощущениям побочек даже меньше чем у баклофена и фенибута. Как и фенибут, действует не на всех, и по сравнению с другими ГАМКами довольно слабо.	ГАМК-Б агонист	Стимуляция, седация, дисингибиция, эйфория, уменьшение тревоги	Сонливость, тошнота, нарушения метаболизма		4	1	1000	?	4	6	Нет или неизвестно	Легко	?	?	?
Толперизон Мидокалм	Депрессант	? 	Миролексант, с молекулой похожей на меф, но по эффекту похоже скорее на нормотимики чем на ГАМКи или феник. В больших дозах предположительно действует как холинотон. Инфы о использовании мало. В инструкции пишут не комбинировать с некоторыми другими препаратами. Принимать после еды, натощак биодоступность ниже. А лучше вообще не принимать.	Блокатор потенциал-зависимых натриевых и кальциевых каналов, Н-холинолитик	Седация, овощное состояние	Тошнота, нарушения пищеварения, головокружение, головная боль, сухость во рту, судороги	СИОЗС, DXM, атомоксетин	1	X	300	?	5	8	Нет или неизвестно	Средне	?	?	?
Зопиклон Сомнол, Имован	Депрессант, Галлюциноген	Циклопирролон 	Снотворное с эффектом, похожим на эффект мухоморов, только безнейротоксичности. Как и другие Z-drugs, пожалуй лучшие из доступных снотворных, несмотря на быстро набивающийся от них толер. Сильный галлюциноген, но без мерзких эффектов присущих холиноговну. Дает состояние похожее на сон наяву, действует очень долго. Таблетки толочь и инохат.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, морфи, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	ГАМКи и опиаты в больших дозах	4	6	7,5	15	9	50	Сильная	ПКУ	?	?	?
Залеплон Соната Адамед, Анданте	Депрессант, Галлюциноген	Пиразолопирамидин 	Как зопиклон, только с очень коротким действием и мощнее. То же по отношению к мухоморам, что DMT по отношению к психоцибам. Несмотря на то что препарат не в списках, добить его сейчас практически невозможно.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, морфи, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	ГАМКи и опиаты в больших дозах	4	6	10	60	1	2	Сильная	Трудно	?	?	?

Вещество ¹	Фармгруппа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фармдействие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	Время действия, ч		Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹						
								★ ⁷	Дозы ⁸ , мг			RU	BY	UA	KZ			
Золпидем Санвал, Нимрест	Депрессант, Галлюциноген	Имидазопиридин 	Тот самый Эмбиен. Еще один Z-препарат, тоже мощный сонник с дикой помесью делириантных, психоделических и диссоциативных эффектов, но со средним временем действия. Он вроде как зарегистрирован, но на деле достать мало у кого получалось, в основном через площадки.	Селективный ГАМК-А агонист	Седация, гипнагогия, морфи, галлюцинации, делирий, красочные сновидения	Сонливость, амнезия	ГАМКи и опиаты в больших дозах	4	6	10	50	5	15	Сильная	Список III	?	?	?
Алпразолам Ксанакс, Золомакс	Депрессант	Бензодиазепин 	Мощный транквилизатор и анксиолитик. Достать было тяжело даже в лучшие времена, сейчас и подавно. Заказ по почте чреват скандалом. Внимание: не нужно пытаться поточиться на бензодиазепинах, они не для кайфа, а для сна, уменьшения тревоги. Торчку особенно полезны, так как по сути это лучшие средства для снятия с бодов, паничек, стимуляторных передозов и психозов, серотонинового синдрома. Передозы бензов могут приводить к неконтролируемому поведению с последующей амнезией. Синдром отмены от бензов может быть смертельен.	ГАМК-А агонист	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах	3	7	0,25	1,5	5	8	Очень сильная	Список III	?	?	?
Диазepam Реланиум, Валиум, Сибазон	Депрессант	Бензодиазепин 	Типичный бенз. Действует значительно дольше алпразолама и обладает так же более сильными противосудорожными и снотворными свойствами, но не дает эйфории.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах	X	7	5	15	16	44	Очень сильная	Список III	?	?	?
Феназепам	Депрессант	Бензодиазепин 	Советский ксанакс. Когда-то был доступен, но сейчас хуй достанешь. Покупать на площадках, и в отличие от других бензов бутылка может даже не настигнет твой ану на почте. Валентовский феназепам весьма хренового качества, но к сожалению продают сейчас в основном его. Есть мнение что его надо жрать в гораздо больших дозах чем старый советский, чтобы хоть как-то подействовало.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах	X	5	0,5	10	15	24	Очень сильная	ПКУ	?	?	?
Клоназепам Клонопин	Депрессант	Бензодиазепин 	И еще один бенз. Аналогично алпразоламу, так же иногда используется для достижения эйфории.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги, эйфория	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах	3	7	0,5	2	8	12	Очень сильная	Список III	?	?	?
Гидазепам Диамидаизепам	Депрессант	Бензодиазепин 	Слабый бенз долгого действия, доступный в украинских аптеках. Стоит недешево. Когда-то производился и в РФ, но теперь отсутствует, заказывать из Украины сейчас понятное дело не стоит.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость	ГАМКи и опиаты в больших дозах	X	4	250	500	40	52	Очень сильная	Нет в аптеках	?	Средне	?
Тофизопам Грандаксин	Депрессант	Бензодиазепин 	Атипичный бенз, со слабыми невыраженными эффектами. Есть мнение что эффекты можно списать на плацебо. Зато можно достать.	ГАМК-А модулятор	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость		X	1	50	250	6	8	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹			
									RU	BY	UA	KZ					
Фабомотизол Афобазол	Депрессант	? 	Вроде бы анксиолитик, но на деле скорее всего пустышка как и грандаксин. Может быть можно использовать как снотворное. Так же в некоторых исследованиях пишут про ингибирующие свойства в отношении МАО.	Агонист мелатониновых рецепторов, сигма агонист, ингибитор MAO-A	Седация, уменьшение тревоги	Сонливость, головная боль	X 1 ?	?	?	2	3	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?	
Эмоксипин Мексидол, Мексикор	Депрессант	? 	Вроде как ноотропное средство, для в/м введения. Хотя есть и таблетки, но они менее эффективны, видимо из-за низкой биодоступности. Сам по себе не прет, но помогает сниматься с отмены любых других ГАМКов, включая альо, габапентиноиды, и бензодиазепины. Хотя некоторые говорят что им не помогает. Также может усиливать ГАМКи при одновременном приеме (до 1000 мг перорально), и возможно даже препятствует быстрому формированию толера, но все это не точно. Вызывает сонливость, может быть кому-то подойдет как снотворное. На отмене принимать 2-3 раза в сутки ¹⁴ .	ГАМК модулятор, модулятор ацетилхолиновых рецепторов	Седация	Сонливость	Габапентиноиды	X 4	100	500	Принимать курсом	Нет или неизвестно	Легко	Легко	Легко	?	
Идебенон Нобен, Новобенон	Депрессант	? 	Еще один типа ноотроп, который может помочь слезть с ГАМКов лесенкой или восстановиться после запоя (а может и не помочь). Механизм действия непонятен.			Тошнота, расстройства пищеварения	X 2	30	90	Принимать курсом	Нет или неизвестно	Легко	Легко	?	?		
Арипипразол Арипризол, Зилаксера; BY: Абизол ; UA: Арилентал	Нейролептик	? 	Мощный атипичный нейролептик. Сниматься с психозов. Стоит дорого. Внимание: не нужно пытаться торчать на нейролептиках, они для купирования шизы и для сна. Сочетание нейролептиков с депрессантами повышает риск передоза и комы. Сочетание с серотонинергическими веществами может приводить к серотониновому синдрому. Нейролептики сильно токсичны и могут вызывать серьезные нарушения метаболизма и гормонального фона.	Антагонист 5-HT 2, D2	Седация, овощное состояние	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства	X 2	10	30	48	96	Слабая	Трудно	?	?	?	
Оназапин Зипрекса, Зипаста	Нейролептик	? 	Тоже атипичный нейролептик, для тех кого арипризол уже не вставляет и нужно помощнее. Или для тех кому нужно подешевле. Токсичность еще выше, но все же не такая сильная как у типичных нейролептиков. Возможно имеет холинолитические эффекты в больших дозах, но лучше не проверять.	Антагонист 5-HT 2, D1, D2, D3, антигистамин, М-холиноблокатор, альфа-адреноблокатор	Седация, овощное состояние	Сонливость, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства, сухость во рту	X 2	5	20	12	54	Слабая	Трудно	?	?	?	
Алимемазин Тералиджен	Нейролептик	? 	Еще один дорогой атипичный нейролептик, но помягче и с антигистаминными эффектами. Можно использовать как анксиолитик или снотворное, но лучше все-таки найти менее токсичные препараты.	Антигистамин, антиагонист D2	Седация, уменьшение тревоги, овощное состояние	Сонливость, головокружение, сухость во рту	X 2	20	80	6	12	Слабая	Трудно	?	?	?	
Кветиапин Серокель, Кетипелт; UA: Кветирон, Кветиксол	Нейролептик	Дibenзотиазепин 	Более доступный атипичный нейролептик. Используется как снотворное, и как овощающее успокоительное, но можно и сниматься с дофаминовых психозов. Есть отчеты, что дает яркие красочные сны при приеме на ночь.	Антигистамин, антиагонист 5-HT 1, 5-HT 2, D1, D2	Седация, уменьшение тревоги, овощное состояние, красочные сновидения	Сонливость, головная боль, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства	X 2	50	300	7	20	Слабая	Трудно	?	?	?	
Сульпирид Эглонил	Нейролептик	? 	Нейролептик, якобы с антидепрессивным и стимулирующим эффектом. Противоречивое.	Антагонист 5-HT 2, D2, D3		Бессонница, расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства	X 1	200	800	4	8	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?	

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹					
									RU	BY	UA	KZ							
Метоклопрамид			Противорвотное. Вроде как можно использовать в качестве легкодоступного нейролептика.		Антагонист D2	Расстройства пищеварения, гормональные нарушения, экстрапирамидные расстройства		X	1	?	?	3	6	Нет или неизвестно					
Церукал	Нейролептик														Легко	?	?	?	
Флуоксетин			Самый доступный из антидепрессантов. Хотя в целом антидепрессанты не то чтобы доступны нынче - из-за отдельного приказа минздрава по ним, доставать их тяжелее чем многие горчевые препараты. Принимать курсом, как и все СИОЗС. Как очевидно из названия группы, лечит депрессию. Вызывает неприятную стимуляцию и ажитацию. Внимание: сочетание разных групп антидепрессантов между собой или с некоторыми другими серотонинергическими веществами (MDMA, DXM, трамадол, 5-HTP, и прочие) приводит к тяжелому серотониновому синдрому, возможен летальный исход. Антидепрессанты могут парадоксально усиливать суицидальные мысли.						X	3	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?
Прозак	Антидепрессант		Примерно то же что и флуоксетин, но помощнее и еще со слабыми антигистаминными эффектами.	СИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	4	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Пароксетин																			
Паксил	Антидепрессант			СИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	4	20	60	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Сертралин																			
Золофт	Антидепрессант		Еще одно вещество из той же группы что флуоксетин с пароксетином, но немного поприятнее и с менее жесткой отменой.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	4	50	200	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Флуовоксамин																			
Феварин	Антидепрессант		И еще один аналог флуоксетина. Есть мнение что он может переть и давать недолгую эйфорию если рассасывать под языком.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	4	50	300	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Эсциталопрам																			
Селектра, Ципралекс	Антидепрессант		Тоже селективный ингибитор обратного захвата серотонина, отличается меньшей частотой возникновения побочек.	СИОЗ серотонина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	4	10	20	Принимать курсом	Слабая		Трудно	?	?	?	
Венлафаксин																			
Велаксин	Антидепрессант		Вроде как один из лучших имеющихся стимулирующих антидепрессантов. Ходят слухи что помимо прочего так же связывается с опиоидными рецепторами, если упирать в больших дозах. Сильный синдром отмены, по сравнению с другими антидепами.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	5	75	225	Принимать курсом	Сильная		Трудно	?	?	?	
Дулоксетин																			
Симбалта	Антидепрессант		Что-то наподобие венлафаксина, тоже один из лучших имеющихся стимулирующих антидепрессантов.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессонница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X	5	60	120	Принимать курсом	Сильная		Трудно	?	?	?	

Вещество ¹	Фарм группа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фарм действие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	☆ ⁷	Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹			
									RU	BY	UA	KZ					
Милнаципран Иксел	Антидепрессант		Тоже СИОЗСН, но в аптеках нет, заказывать как обычно у перекупов индийского.	СИОЗ серотонина и норадреналина	Стимуляция, мания	Бессоница, понижение либido, головная боль, потеря аппетита, тахикардия, тошнота	СИОЗС, мускат, сибутрамин, нефопам, трамадол, тапентадол, ИМАО, DXM, MDMA, 5-HTP	X 5	50	200	Принимать курсом	Сильная	Нет в аптеках	?	?	?	
Селегелин Депренил, Элдеприл	Антидепрессант		Фенэтиламин Один из немногих еще доступных ИМАО. Селективен к МАО-Б, но в больших дозах ингибирует и МАО-А, возможно разгоняет психоделики (но это не точно). Одним из метаболитов является левометамфетамин. Используется для лечения СДВГ. Внимание: эффект приема ИМАО может сохраняться до двух недель. В течение этого времени стоит избегать препаратов, которые могут спровоцировать серотониновый синдром.	Ингибитор МАО-Б	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, диарея	Амфетамины, СИОЗС, DXM, MDMA, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-HTP, трамадол, тапентадол, ТЦА	3 4 ?	?	2	4	Нет или неизвестно	Нет в аптеках	?	Трудно	Нет в аптеках	
Разагилин Азилект	Антидепрессант		? Еще один селективный ингибитор МАО-Б. Назначается паркинсоникам, но возможно работает и для СДВГ и депрессии. Интересных метаболитов не имеет, зато имеет много побочек. В отличие от большинства других ИМАО, присутствует в аптеках, но ИРЛ достать очень проблематично как и все антидепрессанты. Ценник просто конский.	Ингибитор МАО-Б	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, гипертензия, головная боль, диарея	Амфетамины, СИОЗС, DXM, MDMA, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-HTP, трамадол, тапентадол, ТЦА	X 3 ?	?	?	?	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?	
Транилципромин	Антидепрессант		Фенэтиламин 	Неселективный ИМАО. Достается у индусов, как и селегелин. Вроде как тоже метаболизируется во что-то амфетаминовое и разгоняет.	Ингибитор МАО, релизер дофамина	Стимуляция	Бессоница, тахикардия, диарея	Амфетамины, СИОЗС, DXM, MDMA, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-HTP, трамадол, тапентадол, ТЦА	3 4 ?	?	2	3	Нет или неизвестно	Нет в аптеках	?	?	?
Пирлиндол Пираизидол	Антидепрессант		? Обратимый ИМАО, селективный к МАО-А, что возможно делает его более подходящим для разгона психоделиков. Инфо о применении очень мало. Имеется в продаже, и в отличие от азилекта относительно дешевый.	Ингибитор МАО-А	Стимуляция, мания	Бессоница, тахикардия, тошнота	СИОЗС, DXM, MDMA, нефопам, сибутрамин, мускат, 5-HTP, трамадол, тапентадол, ТЦА	X 3 ?	?	2	8	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?	
Амитриптилин	Антидепрессант, Делириант		? Трициклический антидепрессант. Помимо собственно антидепрессивного эффекта еще и сильно овощает. Можно упаривать как слабый холинолитик (но не нужно) или чтобы послать (но тут смотрим на время действия).	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, овощное состояние, морфи, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия	5-HTP, ИМАО	1 3	50	300	18	46	Слабая	Трудно	?	?	?
Кломипрамин Анафранил	Антидепрессант, Делириант		? Еще один трициклик холинолитик для любителей спать сутками, более мощный и с большим количеством побочек.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, мания, овощное состояние, морфи, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия, нарушения метаболизма	5-HTP, ИМАО	1 3	25	150	19	54	Слабая	Трудно	?	?	?
Имипрамин Мелипрамин	Антидепрессант, Делириант		? И еще ТЦА, вроде бы с меньшим количеством холиновых эффектов и более стимулирующий чем овощащий.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, мания, овощное состояние, морфи, галлюцинации	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия	5-HTP, ИМАО	1 4	75	250	8	24	Слабая	Трудно	?	?	?
Досулефин Дотиепин	Антидепрессант		? Индийский ТЦА, для не таких как все. Овердозами пить не выйдет из-за сильной токсичности.	ИОЗ серотонина и норадреналина, М-холинолитик, антигистамин	Седация, овощное состояние	Сонливость, сухость во рту, гипотензия, аритмия, токсический гепатит	5-HTP, ИМАО	X 2 ?	?	15	45	Слабая	Нет в аптеках	?	?	?	

Вещество ¹	Фармгруппа ²	Хим группа / Формула	Описание	Фармдействие ³	Эффекты ⁴	Побочки ⁵	Сочетания ⁶	[☆] ⁷		Дозы ⁸ , мг		Время действия, ч	Зависимость ⁹	Отбивка ¹⁰	Доступность ¹¹					
								RU	BY	UA	KZ				RU	BY	UA	KZ		
Миртазапин Каликста	Антидепрессант, Галлюциноген	Пиперазиноазепин 	Тетрациклический антидепрессант, тоже несколько овощащийся. От долгого применения жиреют из-за повышенного аппетита, жрать хочется как от покура травы. Мощное снотворное, пожалуй лучшее что есть после Z-препаратов. Дает видения с закрытыми глазами, чем-то похожие на диссовые, но более реалистичные. В больших дозах оказывает странное галлюциногенное действие, с морфином, трейсерами и психodelической геометрией, если это все конечно не проспать. При этом когнитивные эффекты, свойственные дискам, психоте, или делириантам отсутствуют. Метаболизируется CYP1A2, CYP2D6 и CYP3A4.	Антагонист 5-HT ₂ , каппа агонист, антагонист альфа-2 адренорецепторов, М-холинолитик, антигистамин		Седация, гипнагогия, морфи, галлюцинации	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение, сужение зрачков	5-HTP, ИМАО	X	4	5	45	270	14	24	Слабая	Трудно	?	?	?
Миансерин Миасер, Леривон	Антидепрессант, Галлюциноген	Пиперазиноазепин 	Тоже тетрациклик, родственный миртазапину. Вроде должно иметь скажем эффекты, возможно не так усыпляет из-за норадреналиновой стимуляции, но инфы о применении пока нет. Есть предположения, что связывается еще и с мю рецепторами помимо каппа, и даёт какие-то опиоидные эффекты, но никто не проверял. Метаболизируется CYP2D6.	Антагонист 5-HT ₂ , каппа агонист, антагонист альфа адренорецепторов, ИОЗ норадреналина, М-холинолитик, антигистамин		Седация, гипнагогия, морфи, запор	Сонливость, усиление аппетита, сухость во рту, головокружение, сужение зрачков, запор	5-HTP, ИМАО	X	4	5	?	?	?	?	Слабая	Трудно	?	?	?
Тразодон Тритико	Антидепрессант, Делириант	Фенилпиперазин 	Атипичный антидепрессант с необычными свойствами афродизиака. Может быть можно использовать для стояка, хотя сосуды не расширяет в отличие от йохимбина. Овощит значительно меньше чем трициклики, но все равно можно использовать как снотворное, и в этом плане он наверное даже лучше из-за короткого времени действия.	Антагонист 5-HT ₂ , ИОЗ серотонина, М-холинолитик, антигистамин		Седация, повышение либido	Сонливость, аритмия, головокружение, тошнота, сухость во рту, запор	5-HTP, ИМАО	X	1	4	75	600	3	9	Нет или неизвестно	Трудно	?	?	?
Родиола розовая	Антидепрессант	?	Водно-спиртовой экстракт. Безрецептурен, но столь же редок в аптеках, как и то растение из которого его производят. Иногда еще можно найти в таблетках, но они дорогие, или попадается в виде порошка на сайтах торгующих БАДами. Содержит алкалоиды, неселективно ингибирующие monoaminokсидазу. Вероятно может разгонять психоактивы, но инфы о применении мало.	Ингибитор МАО	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, гипертензия головная боль	СИОЗС, DXM, MDMA, сибутрамин, мускат, нефопам, трамадол, тапентадол, ТЦА, 5-HTP	X	3	?	?	?	?	?	?	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	?	?
5-Гидрокситриптофан 5-HTP	Антидепрессант	Индоламин 	Продается как биодобавка. Проходит ГЭБ и превращается в серотонин. Имеет слабый антидепрессивный эффект. В больших дозах могут быть легкие морфи и трейсеры. Некоторые пьют его в дни после приема MDMA чтобы облегчить отхода, но вообще различные сочетания опасны серотониновым синдромом.	Прекурсор серотонина	Стимуляция, седация, красочные сновидения	Изжога, тошнота, диарея, тахикардия, сонливость	СИОЗС, ТЦА, ИМАО, DXM, MDMA, сибутрамин, мускат, нефопам, трамадол, тапентадол	X	3	100	500	2	4	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?	
L-Тирозин	Антидепрессант	Фентиламин 	Еще одна биодобавка, на этот раз превращающаяся в дофамин. Возможно этим можно как-то облегчать стимуляторные отхода, но как оно на деле хрен его знает.	Прекурсор дофамина	Стимуляция, понижение аппетита	Головная боль, бессонница, тошнота	Амфетамины, кокаин, ИМАО	X	2	500	4000	2	4	Нет или неизвестно		Без рецепта				
Мелатонин	Антидепрессант	Индоламин 	Еще одна биодобавка. Вырабатывается в организме естественным образом, регулирует циклы сна. Биодоступность низкая, лучше рассасывать таблетки под языком. Используется как слабое снотворное, вызывает очень яркие сны.	Агонист мелатониновых рецепторов	Седация, красочные сновидения	Тошнота, головная боль		X	2	3	9	6	10	Нет или неизвестно		Без рецепта	?	Без рецепта	?	
Зверобой	Антидепрессант	?	Трава с очень слабыми антидепрессивными свойствами. Содержит гиперицин и гиперфорин. Ингибитор МАО и дофамин-бета-гидроксилазу, фермент превращающий дофамин в норадреналин. Индуktor ферментов CYP3A4 и CYP2C9.	Ингибитор МАО, ингибитор ДБГ	Стимуляция	Бессонница, тахикардия, гипертензия расстройства пищеварения	СИОЗС, DXM, MDMA, сибутрамин, мускат, нефопам, трамадол, тапентадол, ТЦА, 5-HTP	X	2	?	?	?	3	12	Нет или неизвестно	Без рецепта	?	Без рецепта	?	

1) Сверху обычным шрифтом указано непатентованное наименование химического вещества. Снизу курсивом указаны наименования патентованных препаратов этого вещества, в том числе комбинированные. Вещество может продаваться под непантованным, либо под одним из торговых наименований. Для препаратов, продающихся в других странах кроме России, указаны префиксы: UA - Украина, BY - Беларусь, KZ - Казахстан. Например, для DXM это значит что Каффетин Колд и Тофф+ продаются в РФ, Фармавекс продается в РБ, а Милистан и Цетло+ продаются в Украине. Цветом фона обозначено количество имеющихся сведений о торчевом использовании препарата: белым - обычные препараты, о которых известно достаточно; голубым - классика, проверенная временем, такие препараты имеют долгую историю применения и хорошо изучены; желтым - странное и непроверенное, экспериментальные препараты, о которых известно достаточно мало.

2) Минутка википедического аутизма. Один препарат может принадлежать ко многим группам одновременно, но указывается одна или две, эффекты которых наиболее выражены. **Стимуляторы** увеличивают активность центральной нервной системы, способствуют психомоторному возбуждению. Один из трех основных классов психоактивных веществ наряду с депрессантами и галлюциногенами. Типичные эффекты включают уменьшение усталости и сонливости, усиление фокуса, подавление аппетита, ускорение мышления, эйфорию. Побочные эффекты включают учащение сердцебиения, повышенное артериальное давление, повышенную температуру тела, сужение сосудов. **Антидепрессанты** являются подтипом стимуляторов, но вынесены в отдельную категорию. Эффекты антидепрессантов в целом похожи, но развиваются не сразу а по мере терапевтического приема, эти вещества как правило представляют малый интерес с точки зрения торча. **Депрессанты** снижают активность в ЦНС, уменьшают возбуждение в различных областях мозга. Типичные эффекты включают седацию, подавление тревоги, дезингибрование, расслабление мышц и эйфорию. Побочные эффекты включают тошноту, снижение артериального давления, снижение частоты сердечных сокращений, угнетение дыхания. В высоких дозах могут вызывать полную анестезию. **Опиоиды** являются подтипом депрессантов, но вынесены в отдельную категорию. В отличие от других депрессантов, опиоиды воздействуют не на ГАМК систему, а на рецепторы эндорфинов. Типичные эффекты включают дополнительное подавление боли, подавление кашля, очень сильную эйфорию и визуалы с закрытыми глазами. Типичные побочные эффекты включают дополнительное чесотку, запор, сужение зрачков. Нейролептики являются еще одним подтипом депрессантов с отдельной категорией. Нейролептики представляют собой класс веществ, блокирующих дофаминовые и серотониновые рецепторы в мозгу, и в основном используются для лечения психоза, особенно при шизофрении. Типичные эффекты включают седацию, замедление мышления, апатию, подавление мотивации, анализа и фокуса. Типичные побочные эффекты включают экстрапирамидные симптомы, гиперпролактинемию и другие метаболические аномалии. Галлюциногены вызывают мощные изменения в восприятии, настроении и различных когнитивных процессах. **Галлюциногены** принципиально отличаются от стимуляторов и депрессантов - вместо того, чтобы просто усилить или ослабить существующие состояния сознания, они производят качественно уникальные состояния, в которых реальность воспринимается новым образом. Конкретно здесь категория "галлюциногены" присвоена веществам, которые не относятся однозначно к одному из трех основных подтипов галлюциногенов (психоделики, диссоциативы, делирианты) и обладают эффектами всех трех. **Психоделики** являются серотонинергическими галлюциногенами, которые вызывают измененное состояние сознания, характеризующееся необычными изменениями в восприятии, настроении и когнитивных процессах. Типичные эффекты включают визуалы с открытыми и закрытыми глазами, искажение времени, усиление чувств, усиление самоанализа, концептуальное мышление, эйфорию и потерю его. Побочные эффекты кроме расширенных зрачков являются редкими, но возможны неблагоприятные психологические реакции (тревога, бред, психоз). **Диссоциативы** - это класс галлюциногенов, который работает, блокируя NMDA рецепторы глутамата. Вещества этого класса характеризуются искаженными сенсорными восприятиями и чувством отключения или отрещения от окружающей среды и себя. Феноменология часто описывается с точки зрения уменьшения или блокировки сигналов в сознательный разум из других частей центральной нервной системы. Типичные эффекты во многом похожи на психоделики, но также включают изменения в восприятии гравитации, подавление тактильных ощущений, аналгезию и, в высоких дозах, полную анестезию. Побочные эффекты также включают потерю моторного контроля, угнетение дыхания и задержку мочи. **Делирианты** представляют собой подкласс галлюциногенов, которые работают посредством антихолинергической активности. Они имеют уникальное свойство производить неотличимые от реальности галлюцинации, интегрированные в нормальное восприятие. Наиболее распространенные темы для этих галлюцинаций включают в себя повседневные случаи типа курения фантомных сигарет, разговор с людьми, которых на самом деле нет, насекомых, призраков, демонов и другие кошмары. Типичные побочные эффекты включают тахикардию, аномальный ритм сердца, гипертонию, сухость во рту, беспокойные ноги, частое мочеиспускание, сонливость, восприятие тяжести тела, амнезию, беспокойство, растерянность, паранойю и дисфорию.

3) Здесь указано только действие, приводящее к психоактивным эффектам.

4) Стимуляция - ощущение энергичности, бодрости, мотивации выполнять какие-либо задачи, желания двигаться, ускорение мыслей. Седация - ощущение расслабленности, нежелание двигаться и работать, замедление мыслей. Опьянение. Уменьшение тревоги - ослабление негативных эмоций, раздражения, страха. Эйфория - ощущение комфорта, удовлетворения, благополучия, приподнятоего настроения, восторга, радости, счастья. Эмпатия - усиление чувства сопереживания и любви к другим людям, желания и способности общаться, снижение страхов связанных с социальными ситуациями. Дисингибии - склонность к импульсивному поведению и немедленному удовлетворению потребностей, ориентация на текущие мысли и внешние раздражители, подавление эмоциональной сдержанности, безрассудство, плохая оценка риска и игнорирование социальных соглашений. Гипнагогия - красочные реалистичные видения с закрытыми глазами, похожие на осознанные сны; видения от опиатов обычно называются дрёмами. Морфи - искажения зрительного восприятия, при которых поверхности и текстуры кажутся движущимися и текущими, а формы объектов произвольно гнутся и меняются. Галлюцинации - восприятие объектов, которых на самом деле не существует; могут быть зрительными, слуховыми, тактильными. Делирий - полная дезориентация, потеря способности отличать галлюцинации от реальности. Диссоциация - чувство отстраненности от реальности и самого себя, притупление тактильных ощущений и чувства своего тела, видения с закрытыми глазами (как правило абстрактная геометрия), и другие измененные состояния сознания. Психоделия - усиление чувств, обострение восприятия, искажение восприятия времени, склонность к самоанализу и концептуальному мышлению, видения с закрытыми глазами (как правило абстрактная геометрия), и другие измененные состояния сознания. Красочные сновидения - повышение частоты возникновения сновидений, их длительности, яркости, интенсивности переживаний в них; так же повышение вероятности осознанных снов. Овощное состояние - подобно седации, но вместо приятного расслабления это просто неспособность нормально мыслить, фокусироваться, испытывать эмоции, и заниматься какой-либо деятельностью. Мания - подобно стимуляции, но вместо приятной энергичности это просто ажитация, неспособность найти себе место, нервозность. Повышение либido - усиление полового влечения. Улучшение восприятия музыки - ощущение что музыка звучит лучше, четче, объемнее, гармоничнее, приносит больше удовольствия и эмоций, чувствуется и осознается каждый звук в мелодии.

5) Тахикардия - увеличение частоты сердечных сокращений. Брадикардия - уменьшение частоты сердечных сокращений. Аритмия - все прочие нарушения сердечного ритма. Гипертензия - повышенное артериальное давление. Гипотензия - пониженное артериальное давление. Вазоконстрикция - сужение сосудов. Гипертермия - повышение температуры тела. Тяжесть - чувство того что тело стало значительно тяжелее, трудность в перемещении, усталость. Амнезия - потеря памяти, обычно невозможность вспомнить то что происходило под действием вещества. Задержка мочи - невозможность или трудность мочеиспускания. Гормональные нарушения - от нейролептиков это обычно повышение уровня пролактина. Экстрапирамидные расстройства - дрожь в конечностях, спонтанные движения. Понижение либido - уменьшение полового влечения, невозможность возбуждения и эрекции.

6) Комбинации с другими веществами. **Зеленым** выделены хорошие, годные комбинации. **Оранжевым** обозначены потенциально опасные, нужен осторожный подход. **Красным** выделены те, от которых почти наверняка будет гроб, гроб, кладбище, пидор.

7) Рейтинг по шкале от 1 до 7, первый для торчевого применения, второй для утилитарного. Утилитарные вещества являются психотропами так же как и торчевые, но плохо подходят для приема в высоких дозах с целью получения каких-то положительных приятных эффектов. Однако, они могут полезны для снятия побочных эффектов других препаратов и лечения разного рода психических отклонений (СДВГ, депрессия, ОКР, тревога, психоз, бессонница, и прочее). Если вещество не имеет торчевой оценки, значит оно не подходит для торчевого применения, и используется только утилитарно. Аналогично, если вещество не имеет утилитарной оценки, то его психоактивные эффекты находят только торчевое применение (хотя вещество может все еще быть полезно по назначению, например от боли или от кашля). Все оценки субъективны, и выдаются на основании моего личного опыта, опытов анонимов из треда, и трип-репортов которые могут быть найдены онлайн. Учитываются как эффекты, так и побочки и прочие особенности применения. Относитесь к оценкам торчевых веществ как к вероятности того что вам это вещество понравится (7 - выбор редакции, препараты, которые являются одними из лучших для торча в принципе; 6 - нравится большинству, выраженные эффекты, мало побочек; 5 - нравится многим; 4 - 50/50; 3 - на любителя, слабые эффекты, сильные побочки; 2 - нравится очень мало кому; 1 - лучше вообще такое никогда не трогать), к оценкам утилитарных веществ как к вероятности того что вам это вещество будет полезно для решения каких-то врожденных или возникших от употреба проблем (7 - торчу лучше всегда иметь что-то такое в домашней аптеке; 6 - определенно полезная вещь; 5 - полезно, но могло быть и посильнее, или сильный препарат при определенных проблемах; 4 - ситуативно может пригодиться, или полезно при определенных проблемах хотя есть препараты лучше; 3 - кому-то ситуативно может пригодиться, но слабые эффекты или выраженные побочки; 2 - только для узкого круга проблем, или очень сильные побочки, или есть препараты намного сильнее; 1 - практически бесполезно). Для плохо изученных препаратов рейтинги могут быть спекулятивны (обозначены более светлым шрифтом), по причине отсутствия достаточного количества репортов. Оценки могут меняться на основании получаемых новых данных об использовании вещества.

8) Дозировки указываются без учета толерантности, на среднего человека. Всегда нужно начинать принимать неизвестное вещество в минимальных дозах, масса тела, особенности метаболизма и чувствительность рецепторов у всех разная. Максимальные дозы могут быть опасны, особенно справедливо для делириантов, хотя у стимуляторов есть риск опасных сердечно-сосудистых побочек, а передозы депрессантов могут приводить к коме и остановке дыхания. Дозировки с высоким толером могут быть значительно больше чем указанные, поэтому не стоит удивляться если кто-то в треде пишет что упирает конские дозы. Время действия так же может сильно меняться в зависимости от параметров организма. При тестировании комбинаций различных веществ желательно использовать минимальные дозировки.

9) Если у препарата указано "нет или неизвестно", это лишь значит что случаи возникновения зависимости настолько редки, что инфу о них трудно найти. **Слабая** - на препарат тяжело подсесть (в силу того что у него долго набивается и быстро падает толерантность), либо из-за неприятных эффектов не возникает желания употреблять повторно или часто, либо подсесть легко но легко и бросить (слабо выраженный синдром отмены). **Сильная** - на препарат легко подсесть и тяжело бросить, синдром отмены не просто неприятный, но и очень долгий (может длиться месяцами) и сопровождается рядом потенциально опасных симптомов психического (делирий, психоз, суицидальные мысли) и физического (нарушения сердечного ритма, сильные судороги) характера. Любая из категорий может быть присвоена веществу, на которое возможно никто и не подсаживался, но известны случаи зависимости от других веществ с точно таким же фармакологическим действием.

10) Большинство отбивок опциональны, и в небольших дозах возможно перенести побочки дополнительных компонентов препарата без проблем, однако для больших доз лишние компоненты могут подпортить трип и здоровье. Для препаратов с парацетамолом отбивка холодной водой обязательна, так как парацетамол крайне ядовит!

КЦЭ (пример для DXM): Берем 50 мл воды комнатной температуры. Берем щелочь (NaOH) 8-10 г (примерно чайная ложка без горки) на каждые 200 мг дексротеморфана плюс еще 8г. Аккуратно добавляем щелочь в воду (не наоборот!) небольшими порциями, тщательно размешиваем. При растворении щелочи раствор сильно нагревается. Вливаем раствор щелочи в емкость А (пластиковая бутылка 1.5-2 литра), высыпаем туда же гранулы из капсулы тоффт, закрываем крышкой и взбалтываем. Жидкость помутнеет и окрасится в желтоватый, зеленоватый или другой цвет. Добавляем в емкость А еще 50 мл воды и взбалтываем до полного растворения (жидкость станет темно-коричневой или красноватой). Отмеряем 20-40 мл неполярного растворителя (нефрас, бензин галоша) и влияем в емкость А. Закрываем крышкой и сильно трясем 5-10 минут. Позволяем отстояться до полного разделения слоев. Для лучшего разделения слоев можно поставить бутылку в ведро с горячей водой. После разделения слоев растворитель остается сверху. Прикрепляем к большому (20 мл) шприцу трубку и аккуратно вытягиваем растворитель. Пену между слоями можно сбить потряхиванием или нагреванием в горячей воде. Выливаем растворитель в емкость Б (пластиковая бутылка 0.5 литра). Повторяем шаги начиная с добавления растворителя еще 2-4 раза, только трясти уже можно не 5-10 а 2-3 минуты. Альтернативно процессу со шприцем, можно добавлять больше растворителя и сливать слой без растворителя переворачивая бутылку, через проделанную в крышке дырку, затыкая дырку рукой в резиновой перчатке когда останется один растворитель. После этого отмеряем 80 мл теплой воды и растворяем в ней 1 грамм лимонной кислоты (половина чайной ложки). Вливаем раствор лимонной кислоты в емкость Б. Закрываем крышкой и сильно трясем 3-5 минут. Позволяем отстояться до полного разделения слоев. После разделения слоев раствор лимонной кислоты остается снизу. При помощи шприца с трубкой аккуратно вытягиваем нижний слой. Вливаем раствор в емкость В. Альтернативно, сливаем через дырку. Растворитель сохраняем для дальнейшего использования. Выпариваем остатки бензина из раствора, употребляем.

КЦЭ + Сода: Все аналогично предыдущему примеру, но вместо выпаривания проделываем дополнительные манипуляции. Берем 3-4 грамма кальцинированной соды (карбонат натрия, Na₂CO₃), 3 грамма это примерно 1 чайная ложка. Добавляем карбонат натрия в емкость В и тщательно размешиваем. Раствор мутнеет, затем в нем выпадают осадок белые хлопья. Ставим емкость В в морозильную камеру на 15-20 минут. Медленно размораживаем раствор. Готовим шприц с фильтром-ватой, намотанной на иглу или носик шприца. Аккуратно вытягиваем жидкость шприцом и выливаем. В емкости остается белый или сероватый осадок - дексротеморфан-основание.

Холодная вода (для кодеина): Растиликаем таблетки в мелкий порошок. Высыпаем в стакан, заливаем горячей (но не кипящей) водой, примерно в 10 раз больше чем порошка. Тщательно мешаем. После этого ставим в холодильник и ждем пока остынет, должно будет выпасть значительное количество осадка. Отфильтровываем через марлю или кофе-фильтр, осадок остается на фильтре, это парацетамол, его выбрасываем. Отфильтрованный раствор выпариваем, полученные кристаллы соскребаем, это кодеин.

Спирт (для бензидамина): Берем рюмку, высыпаем туда пакет розы. Заливаем ледяным спиртом или водкой из морозилки полную рюмки. Мешаем пару минут. Ждем когда осадок опустится на дно. Аккуратно сливаю спирт в другую тару, осадок выбрасываем (это соль). Повторяю процедуру с мешанием и осаждением 1-2 раза. После этого выпариваем. Ставим кастрюлю с водой на плиту, на нее широкую плоскую тарелку вместо крышки. Выливаем на тарелку спиртовой экстракт, при необходимости подливаем в процессе выпаривания. Ждем пока спирт почти испарится, после чего снимаем тарелку и оставляем пока не испарятся остатки спита. Получаем на тарелке кристаллы, соскребаем в порошок, это бензидамин.

Выпаривание (для фенобарбитала): Выливаем корвалол на большой поднос и оставляем в хорошо проветриваемом помещении. Ждем пока не останутся сухие белые кристаллы, соскребаем их, это фенобарбитал. Чтобы получить значительное количество фенобарбитала придется повторять несколько раз.

11) **Без рецепта** - препарат официально продается без рецепта. **Легко** - препарат формально продается по рецепту, но его почти никогда не спрашивают. **Средне** - препарат продается по рецепту, и у вас его могут спросить, возможно придется обойти несколько аптек пока пройдет. **Тяжело** - препарат продается по рецепту, и его почти всегда спрашивают и часто отказывают при его отсутствии, возможно придется обойти большое количество аптек, или заказывать препарат онлайн. **ПКУ** - препарат на строгой учетности и его не продадут ни в какую, нужны поддельные рецепты, и такие препараты имеются лишь в малом количестве аптек. **Список III** - оборот препарата ограничен, в целом то же что и ПКУ, но аптек торгующих ими еще меньше. **Список I/II** - оборот препарата запрещен, получить можно только нелегально. За заказ препаратов из списков психотропных и наркотических веществ по почте у барыг может быть уголовка, при приеме на кладе аналогично. За заказ препаратов ПКУ не из списков может быть административка или уголовка, если вам пришлют особо крупный размер с целью распространения. За перепродажу списковых препаратов так же будет уголовка. Внимание, если вы заказываете ПКУ препараты через интернет, никогда не палите адреса магазинов и серийные номера пачек - по ним ваш канал поставок могут прикрыть мусором. **Нет в аптеках** - препарат не запрещен и не ограничен, но официально не продается, и как правило заказывается онлайн в магазинах, торгующих зарубежной фармой и БАДами. **Ветаптека** - препарат заказывается онлайн в магазинах, снабжающих ветеринарные учреждения.

12) Магний продается в аптеках в виде цитрата, хелата, или лактата. Все это счастье довольно дорогое. Простой магний типа сульфатных удобрений не подойдет, так как он не усваивается, хотя химики могут попробовать сварить из него цитрат. Пить 100-400 мг в пересчете на чистый магний, до, во время, и на отходах. Уменьшает мерзкие побочки вроде высокого давления, аритмии, бессонницы. Ниацин (никотиновая кислота) продается так же в аптеках, и стоит относительно дешево. Помогает от сужения сосудов, которое может проявляться в виде боли в конечностях (особенно пальцах), головной боли, стенокардии. Пить по 10-20 мг во время действия стимулятора, как только начинают ощущаться побочки. Действует недолго, но передознуться сложно, поэтому можно кидать например раз в час.

13) Здесь и далее, эффекты, способные в комбинациях между собой вызывать серотониновый синдром, выделены красным. Симптомы серотонинового синдрома: очень высокая температура с лихорадкой, очень высокий пульс и давление, судороги, тремор, непроизвольные движения, ажитация, спутанное сознание, бессонница, тошнота, рвота, понос. Длится от 1 до 3 суток, в тяжелых случаях может быть смертелен, спасают только бензодиазепины, при отсутствии бензодиазепинов можно попробовать фенобарбитал.

14) Примерная схема лесенки для баклофена с помощью нобена и мексидола (1/1/1 - утро/день/вечер) -

1 день: 250мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

2 день: 225мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

3 день: 200мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

4 день: 175мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

5 день: 150мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

6 день: 125мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

7 день: 100мг баклофена + 30мг нобена + 1/2/1 125мг мексидола

8 день: 75мг баклофена + 30мг нобена + 2/2/1 125мг мексидола

9 день: 50мг баклофена + 30мг нобена + 2/2/1 125мг мексидола

10 день: 25мг баклофена + 30мг нобена + 2/2/1 125мг мексидола

11 день: 60мг нобена + 2/1/1 125мг мексидола

12 день: 60мг нобена + 2/1 125мг мексидола

13 день: 60мг нобена + 1/1 125мг мексидола

14 день: 60мг нобена + 1/1 125мг мексидола